

**ACERACEAE Juss.**, Gen. Pl. 250: 1789.

Nota: Parte de Sapindaceae (APG III 2009).

**ACHARIACEAE Harms**, Nat. Pflanzenfam. 1: 256. 1897.

Por M. Moraes R. (LPB) y P.M. Jørgensen (MO); revisado por S.G. Beck (LPB).

3 géneros, 3 especies, 0 especies endémicas.

**Carpotroche Endl.**, Gen. Pl. 918: 1839.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Carpotroche longifolia (Poepp.)**

**Benth.**, J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5(Suppl. 2): 82. 1861.

Sin.: *Mayna longifolia* Poepp.

Ref.: Sleumer (1980a).

Arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: CO, PA.

Muestra: *A.H. Gentry et al. 77601* (LPB, MO).

**Lindackeria C. Presl**, Reliq.

Haenk. 2(2): 89. 1835.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Lindackeria paludosa (Benth.)**

**Gilg**, Nat. Pflanzenfam. (ed. 2) 21: 404. 1925.

Sin.: *Mayna paludosa* Benth.

Ref.: Sleumer (1980a), Moraes R. (1990), Parker & Bailey (1991), Moraes R. (1993d).

Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, LP, PA.

Muestra: *S.G. Beck 20033* (LPB, MO).

**Mayna Aubl.**, Hist. Pl. Guiane 2: 921, t. 352. 1775.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Mayna odorata Aubl.**, Hist. Pl.

Guiane 2: 921–922, t. 352. 1775.

Ref.: Sleumer (1980a), Parker & Bailey (1991), Moraes R. (1993d), Alverson et al. (2000).

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1000, 1500–2000 m.

Dept.: BE, LP, PA.

Muestra: *A. Araujo M. et al. 1552* (LPB, MO, NY).

**ACHATOCARPACEAE Heimerl**,

Nat. Pflanzenfam. (ed. 2) 16c: 174. 1934.

Por P.M. Jørgensen (MO); revisado por S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY).

1 género, 3 especies, 0 especies endémicas.

**Achatocarpus Triana**, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 9: 45. 1858.

3 especies, 0 especies endémicas.

**Achatocarpus microcarpus Schinz & Aufran**, Bull. Herb. Boissier 1: 8. 1893.

Ref.: Valenzuela Celis (1993a).

Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Seco Chaqueño, 500–1000 m.

Dept.: TA.

Muestra: *T. Herzog 1058* (S).

**Achatocarpus nigricans Triana**, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 9: 46. 1858.

Ref.: Eliasson (1993b), Valenzuela Celis (1993a).

Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano, Sabanas Benianas del Sur, Valles Secos, 0–2000 m.

Dept.: BE, CO, LP, SC.

Muestra: *S.G. Beck 5174* (DAV, LPB, M, NY).

**Achatocarpus praecox Griseb.**,

Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 32. 1879.

Sin.: *Achatocarpus bicornutus* Schinz & Aufran

Ref.: Foster (1958), Digilio (1974), Valenzuela Celis (1993a), López Vargas (1995), González et al. (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Jardim et al. (2003), Nee (2004).

Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Seco Chaqueño, Sabanas Benianas del Sur, Bosque Serrano Chaqueño, Valles Secos, 0–2000 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, SC, TA.

Muestra: *G. Navarro 1654* (LPB, MO, USZ).

Nom. Vern.: Mataco, negrito, palo mataco.

**ACTINIDIACEAE Gilg &**

**Werderm.**, Nat. Pflanzenfam. (ed. 2) 21: 36. 1925.

Por P.M. Jørgensen (MO) y C.

Antezana (BOLV); revisado por S.G. Beck (LPB).

2 géneros, 7 especies, 3 especies endémicas.

**Actinidia Lindl.**, Intr. Nat. Syst.

Bot. (ed. 2) 439. 1836.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Actinidia chinensis Planch.**,

London J. Bot. 6: 303. 1847.

Trepadora. Cultivada. Andes. Yungas, 1500–2000 m.

Dept.: LP.

Muestra: *S.G. Beck 23619* (BOLV, LPB).

**Saurauia Willd.**, Ges. Naturf.

Freunde Berlin Neue Schriften 3: 407, t. 4. 1801.

6 especies, 3 especies endémicas.

**Saurauia chaparensis Soejarto**,

Bot. Mus. Leaflet. 22: 270. 1969.

Ref.: Soejarto (1980), Antezana Valera

(1993a), Navarro Sánchez & Ferreira (2000), Navarro Sánchez & Maldonado

(2002), Nee (2008), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]).

Árbol. Endémica. Andes. Yungas, 2000–2500, 3000–3500 m.

Dept.: CO, LP, SC.

Tipo y muestra: *J. Steinbach 8920* (HT: GH; IT: F, NY, S), *M. Zárate 389* (BOLV).

**[Saurauia excelsa Willd.]**, Ges.

Naturf. Freunde Berlin Mag.

Neuesten Entdeck. Gesamnten

Naturk. 3: 407, t. 4. 1801.

Ref.: Foster (1958).

Nota: El registro se basa en material mal identificado de *S. natalicia*.

**Saurauia glabra (Ruiz & Pav.)**

**Soejarto**, Fieldiana Bot., n.s. 2: 32–33. 1980.

Sin.: *Palaua glabra* Ruiz & Pav.

Ref.: Foster (1958), Soejarto (1980), Brako (1993a).

Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2500–3000 m.

Dept.: LP.

Muestra: *S.G. Beck 1819* (LPB, M).

**Saurauia natalicia Sleumer**,

Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 12: 144. 1934.

Sin.: *Saurauia pseudoparviflora* var. *rusbyana* Buscal.

Ref.: Soejarto (1980), Antezana Valera (1993a), Brako (1993a).

Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1000–2500 m.

Dept.: CO.

Muestra: *T.B. Croat 51312* (LPB, MO).