

Jodina bonariensis (DC.) Kuntze
Ref.: Foster (1958), Killeen (1993c),
López Vargas (1995), Saravia Miranda
(1996), Serrano & Terán (1998
[2000]), Vargas Caballero et al. (2000).
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas,
Bosque Serrano Chaqueño, Valles
Secos, 1000–3000 m.
Dept.: CH, CO, SC.
Muestra: E.C. Vargas & P. Acevedo-
Rodríguez 410 (LPB, US).
Nom. Vern.: Cacha blanca, coca coca,
espino, sombra de toro, tres espinas.

CHENOPODIACEAE Vent., Tabl. Regn. Veg. 2: 253. 1799.

Nota: Parte de Amaranthaceae (APG
III 2009).

CHLORANTHACEAE R. Br. ex Sims,
Bot. Mag. 48: sub pl. 2190. 1820.
Por M. Moraes (LPB); revisado por
M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M.
Jørgensen (MO).
1 género, 7 especies, 1 especie
endémica.

Hedyosmum Sw., Prodr. 5, 84.
1788.
7 especies, 1 especie endémica.

**Hedyosmum angustifolium (Ruiz
& Pav.) Solms**, Prodr. 16(1): 485.
1869.
Sin.: *Tafalla angustifolia* Ruiz &
Pav., *Tafalla laciniata* Ruiz & Pav.,
Hedyosmum laciniatum (Ruiz & Pav.)
Solms, *Hedyosmum scabrum* var.
pavonii Solms, *Tafalla angustifolia*
Kuntze, *Tafalla laciniata* Kuntze,
Hedyosmum pavonii (Solms) Diels
Ref.: Todzia (1988), Moraes R. (1993a).
Arbusto, arbólito, árbol. Nativa. Andes.
Yungas, 1500–3000 m.
Dept.: CO, LP, SC.
Muestra: *N. Salinas* 2439 (LPB, MO).

Hedyosmum cuatrecasanum
Occhioni, Contr. Estud. Fam.
Chloranthaceae 23. 1954.
Sin.: *Hedyosmum crassifolium* Urb.,
Hedyosmum crassifolium Cuatrec.
Ref.: Todzia (1988), Moraes R. (1993a).
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2000–
2500 m.
Dept.: LP.
Muestra: *J.C. Solomon* 9315 (LPB,
MO, NY, TEX).

Hedyosmum dombeyanum Solms,
Prodr. 16(1): 482. 1869.
Sin.: *Tafalla dombeyana* (Solms) Kuntze
Ref.: Todzia (1988), Moraes R. (1993a),
Navarro Sánchez & Ferreira (2000).
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas,
2000–3000 m.
Dept.: CO, LP.
Muestra: *S.G. Beck* 25992A (CTES, K,
LPB, M, MO).

Hedyosmum lechleri Solms, Prodr.
16(1): 484. 1869.
Sin.: *Hedyosmum kanehirae* J.F. Macbr.
Ref.: Todzia (1988), Moraes R. (1993a).
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2000–
2500 m.
Dept.: LP.
Muestra: *J.C. Solomon* 13735 (LPB, MO).

Hedyosmum maximum (Kuntze)
K. Schum., Just's Bot. Jahresber.
26(1): 345. 1900.
Sin.: *Tafalla maxima* Kuntze, *Tafallaea
maxima* Kuntze
Ref.: Foster (1958), Todzia (1988),
Moraes R. (1993a), Navarro Sánchez
& Ferreira (2000).
Árbol. Endémica. Andes. Yungas,
2500–3500 m.
Dept.: CO, LP.
Tipo y muestra: *O. Kuntze s.n.* (HT: B
destr.; LT: G; ILT: G, NY, US; fotos:
F ex B, MO ex B), *N. Salinas* 2143
(LPB, MO).

**Hedyosmum racemosum (Ruiz &
Pav.) G. Don**, Gen. Hist. 3: 434.
1834.
Sin.: *Tafalla glauca* Ruiz & Pav.,
Tafalla racemosa Ruiz & Pav.,
Hedyosmum glabratum Kunth,
Hedyosmum bolivianum Cordem.,
Hedyosmum glaucum (Ruiz &
Pav.) C. Cordem., *Hedyosmum
integrum* Cordem., *Tafalla glabrata*
(Kunth) Kuntze, *Tafalla glauca*
Kuntze, *Tafalla integra* (Cordem.)
Kuntze, *Tafalla racemosa* Kuntze,
Hedyosmum huilense Cuatrec.,
Hedyosmum llanorum Cuatrec.
Ref.: Foster (1958), Todzia (1988),
Moraes R. (1993a), Nee (2004).
Arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas,
Andes. Bosque Húmedo, Yungas,
500–3000 m.
Dept.: BE, CO, LP, SC.
Muestra: *D.N. Smith & Buddensiek*
13520 (BOLV, F, K, LPB, MICH,
MO, TEX).

**Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.)
Solms**, Prodr. 16(1): 480. 1869.
Sin.: *Tafalla scabra* Ruiz & Pav.,
Hedyosmum hirsutum Kunth,

Hedyosmum latifolium Cordem.,
Hedyosmum mandonii Solms, *Tafalla
mandonii* (Solms) Kuntze, *Tafalla
scabra* Kuntze
Ref.: Foster (1958), Todzia (1988),
Moraes R. (1993a), Zárate et al. (1999),
Navarro Sánchez & Ferreira (2000).
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas,
2500–3500 m.
Dept.: CO, LP.
Muestra: *S.G. Beck* 1413 (LPB, NY).

CHRYSOBALANACEAE R. Br.

Narr. Exped. Zaire 433. 1818.

Por G.T. Prance (RNG) y M. Moraes
(LPB); revisado por S.G. Beck (LPB),
M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).
4 géneros, 56 especies, 1 especie
endémica.

Couepia Aubl., Hist. Pl. Guiane 1:
519, t. 207. 1775.
7 especies, 0 especies endémicas.

Couepia bracteosa Benth., J. Bot.
(Hooker) 2: 215. 1840.
Ref.: Prance (1972a), Prance & Sothers
(2003a).
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: PA.
Muestra: *G.T. Prance et al.* 8758
(INPA, NY).

**Couepia grandiflora (Mart. &
Zucc.) Benth. ex Hook. f.**, Fl.
Bras. 14(2): 46. 1867.
Sin.: *Moquilea grandiflora* Mart. &
Zucc., *Couepia formosana* Taub.,
Couepia suberosa Pilg.
Ref.: Prance (1972a), Prance (1989b),
Moraes R. (1993b), Killeen &
Schulenberg (1998), Prance &
Sothers (2003a).

Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas.
Campos Cerrados, 0–1000 m.
Dept.: SC.
Muestra: *I.G. Vargas et al.* 4087 (MO,
USZ).

Couepia krukovií Standl., Publ.
Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.
17(3): 250. 1937.
Ref.: Prance (1989b), Moraes R.
(1993b), Prance & Sothers (2003a).
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Húmedo, 0–500 m.
Dept.: BE.
Muestra: *G. Meyer* 46 (MO, Z).