

Operculina pteripes (G. Don)

O'Donell, Lilloa 23: 435–437, t. 6. 1950.

Sin.: *Calonyction pteripes* G. Don
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Húmedo, 0–500 m.

Dept.: SC.

Muestra: *J.M. Mendoza & C.
Rivadeneira 2409* (LPB, MO, USZ).

Tetralocularia O'Donell, Lilloa 30: 66. 1960.

1 especie, 0 especies endémicas.

Tetralocularia pennellii O'Donell,

Lilloa 30: 68–69, pl. opposite p. 68. 1960.

Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).
Hierba, trepadora. Nativa. Zonas Bajas.
Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, SC.

Muestra: *N.P. Ritter & P.F. Foster 2406*
(FAU, LPB, MO, NHA, USZ).

Turbina Raf., Fl. Tellur. 4: 81. 1836 [1838].

4 especies, 0 especies endémicas.

Turbina abutiloides (Kunth)

O'Donell, Lilloa 23: 505–508, t. 11. 1950.

Sin.: *Convolvulus abutiloides* Kunth
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Semideciduo Chiquitano, Campos
Cerrados, 0–1000 m.

Dept.: SC.

Muestra: *J.R.I. Wood & J.D. Soto
27445* (K, LPB, UB, USZ).

Turbina amazonica D.F. Austin & Staples, Bull. Torrey Bot. Club 118(3): 270–272, f. 1. 1991.

Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Húmedo, 0–500 m.

Dept.: PA, SC.

Muestra: *A.H. Gentry & A. Perry
77997* (LPB, MO).

Turbina cordata (Choisy) D.F.

Austin & Staples, J. Arnold
Arbor. 64: 488. 1983.

Sin.: *Rivea cordata* Choisy, *Ipomoea
martii* Meisn.

Liana. Nativa. Zonas Bajas, Andes.
Bosque Semideciduo Chiquitano,
Bosque Seco Chaqueño, Campos
Cerrados, Valles Secos, 0–2000 m.

Dept.: CH, CO, SC, TA.

Muestra: *R. Guillén V. et al. 4272*
(ARIZ, MO, NY, SP, USZ).

Turbina corymbosa (L.) Raf., Fl.

Tellur. 4: 81. 1836 [1838].

Sin.: *Convolvulus corymbosus* L.

Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque

Húmedo, Bosque Semideciduo
Chiquitano, 0–500 m.

Dept.: BE, LP, SC.

Muestra: *T. Killeen et al. 2956* (ARIZ,
FAU, LPB, MO, NY, SP).

CORNACEAE Bercht. ex J. Presl,

Prir. Rostlin 2(23): 92, 91. 1825.

Por R.P. López (LPB); revisado por R.
Liesner (MO), M. Nee (NY), S.G.
Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

Cornus L., Sp. Pl. 1: 117–118.

1753.

1 especie, 0 especies endémicas.

Cornus peruviana J.F. Macbr.,

Trop. Woods 19: 5. 1929.

Sin.: *Cornus boliviana* J.F. Macbr.,
Viburnum peruvianum (J.F. Macbr.)
J.F. Macbr.

Ref.: Foster (1958), Macbride (1959b),
Steyermark & Liesner (1987), Arroyo
Padilla (1993b).

Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2000–
3000 m.

Dept.: CO, LP.

Muestra: *J.P. Quispe 109* (LPB).

Nom. Vern.: Wila-wila.

CORSIACEAE Becc., Malesia 1:

238. 1878.

Por S. G. Beck (LPB); revisado por P.
M. Jørgensen (MO).

1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

Arachnitis Phil., Bot. Zeitung

(Berlin) 22: 217. 1864.

1 especie, 0 especies endémicas.

Arachnitis uniflora Phil., Bot.

Zeitung (Berlin) 22: 217. 1864.

Ref.: Ibisch et al. (1996), Neinhuis &
Ibisch (1998).

Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Bosque
Tucumano-Boliviano, 1500–2500 m.

Dept.: CO, SC.

Muestra: *P.L. Ibisch et al. 284*
(94.0444) (B, BOLV, LPB, USZ).

COSTACEAE Nakai, J. Jap. Bot.

17: 203. 1941.

Por N. Paniagua (LPB); revisado por
P.J.M. Maas (L), S.G. Beck (LPB),
P.M. Jørgensen (MO).

3 géneros, 13 especies, 0 especies
endémicas.

Chamaecostus C.D. Specht &

D.W. Stev., Taxon 55(1): 157–158,
f. 1. 2006.

1 especie, 0 especies endémicas.

Chamaecostus subsessilis (Nees

& Mart.) C.D. Specht & D.W.

Stev., Taxon 55(1): 158. 2006.

Sin.: *Globba subsessilis* Nees & Mart.,
Costus warmingii Petersen, *Costus
acaulis* S. Moore, *Costus steinbachii*
Loes., *Costus subsessilis* (Nees &
Mart.) Maas

Ref.: Foster (1958), Maas (1972),
Killeen & Schulenberg (1998).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Húmedo, Bosque Semideciduo
Chiquitano, Sabanas Benianas del
Norte, 0–500 m.

Dept.: BE, PA, SC.

Muestra: *T. Killeen & O. Peña 7168*
(LPB, MO, USZ).

Costus L., Sp. Pl. 1: 2. 1753.

10 especies, 0 especies endémicas.

Costus acreanus (Loes.) Maas, Fl.

Neotrop. 8: 66. 1972.

Sin.: *Costus cylindricus* var. *acreanus*
Loes.

Ref.: Parker & Bailey (1991).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, LP, PA.

Muestra: *J.C. Solomon 6197* (MO).

Costus arabicus L., Sp. Pl. 1: 2. 1753.

Sin.: *Costus glabratus* Sw., *Costus
niveo-purpureus* Jacq., *Costus sextus*

Roem. & Schult., *Costus niveus*

G. Mey., *Costus discolor* Roscoe,

Costus arrabidae Steud., *Costus*

verschaffeltii Lem., *Costus glabratus*

var. *niveo-purpureus* (Jacq.) Petersen,

Costus spiralis var. *hirsutus* Petersen,

Costus pubescens S. Moore, *Costus*

brasiliensis K. Schum., *Costus pilgeri*

K. Schum., *Costus gracilis* Loes.,

Costus pubescens fo. *fibrillosus*

Loes., *Costus validus* Loes., *Costus*

ramosus Woodson

Ref.: Maas (1972), Killeen &

Schulenberg (1998), Alverson et al.

(2000), Arrázola Rivero et al. (2000).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque

Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Muestra: *J.C. Solomon 7941* (MO).

Nom. Vern.: Caña agría.