

Dept.: BE.
Muestra: *L. Cayola 1572A* (LPB, MO, NY).

Dioscorea subhastata Vell., Fl.

Flumin. Icon. 10: pl. 121. 1827.
Sin.: *Dioscorea friesii* R. Knuth
Ref.: Foster (1958), Xifreda (1989),
López Vargas (1995), Saravia
Miranda (1996), Xifreda & Kirizawa
(2003), Pedralli (2004).
Trepadora, liana. Nativa. Andes.
Yungas, 1000–3000 m.
Dept.: CO, LP.
Muestra: *J.C. Solomon 8915* (MO).

Dioscorea tarijensis R. Knuth,

Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem
7: 212. 1917.
Ref.: Foster (1958).
Trepadora. Endémica. Andes. Bosque
Tucumano-Boliviano, 1500–2500 m.
Dept.: TA.
Tipo y muestra: *K. Fiebrig 2915* (HT:
B; IT: F, MO-896715, NY, S; fotos: F
ex B), *S.G. Beck et al. 32050* (LPB).

Dioscorea toldosensis R. Knuth,

Pflanzenr. 4(43): 351. 1924.
Sin.: *Dioscorea violacea* R. Knuth
Ref.: Foster (1958).
Trepadora. Nativa. Andes. Bosque
Tucumano-Boliviano, 1500–2000 m.
Dept.: TA.
Muestra: *K. Fiebrig 2255* (B, F, MO).

Dioscorea trifida L. f., Suppl. Pl.

427. 1781 [1782].
Sin.: *Dioscorea angustifolia* Rusby
Ref.: Foster (1958), Ayala Flores (1998).
Trepadora. Naturalizada, cultivada.
Zonas Bajas. Bosque Húmedo,
Sabanas Benianas del Sur, 0–1000 m.
Dept.: BE, CO, LP, SC.
Muestra: *A.F. Fuentes C. et al. 11137*
(LPB, MO, USZ).
Nom. Vern.: Bachi, binca, ohe, papa
morado, pea, sihuira.

Dioscorea trifoliata Kunth, Nov. Gen.

Sp. (quarto ed.) 1: 275. 1815 [1816].
Ref.: Ayala Flores (1998).
Trepadora. Nativa. Zonas Bajas.
Bosque Semideciduo Chiquitano,
0–500 m.
Dept.: SC.
Muestra: *T. Killeen & R. Guillén V.*
7382 (LPB, MEXU, MO, USZ).

Dioscorea trollii R. Knuth, Repert.

Spec. Nov. Regni Veg. 30: 161. 1932.
Ref.: Foster (1958).
Trepadora. Endémica. Zonas Bajas.
Bosque Húmedo, 500–1000 m.
Dept.: LP.

Tipo: *C. Troll 2776* (HT: B).
Nota: Conocido solamente del tipo.

DIPENTODONTACEAE Merr.,

Brittonia 4: 69, 73. 1941.

Por R. Liesner (MO); revisado por
S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M.
Jørgensen (MO).
1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

Perrottetia Kunth, Nov. Gen.

Sp. (quarto ed.) 7: 73–75, pl. 622.
1825 [1824].
1 especie, 0 especies endémicas.

Perrottetia gentryi Lundell,

Phytologia 57: 453. 1985.
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).
Arbolito, árbol. Nativa. Andes. Yungas,
1000–2500 m.
Dept.: CO, LP, SC.
Muestra: *J.C. Solomon 14947* (LPB, MO).
Nota: Estudios más detallados pueden
comprobar que es co-específica con
P. multiflora Lundell y *P. lanceolata*
Karst.

[Perrottetia quinduensis Kunth],

Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 7:
75–76, t. 622. 1825.
Ref.: Ruiz de Centurión (1993b).
Nota: El registro se basa en material
mal identificado de *P. gentryi* Lundell.

DROSERACEAE Salisb., Parad.

Lond., ad t. 95. 1808.

Por A. Fleischmann (M) y R. Duno
(CICY); revisado por S.G. Beck (LPB),
M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).
1 género, 5 especies, 0 especies
endémicas.

Drosera L., Sp. Pl. 1: 281. 1753.

5 especies, 0 especies endémicas.

Drosera cayennensis Sagot ex Diels,

Pflanzenr. IV. 112(Heft 26): 86. 1906.
Sin.: *Drosera sanariapoana* Steyerem.,
Drosera colombiana A. Fernández,
Drosera panamensis M.D. Correa
& A.S. Taylor, *Drosera pumilla* E.
Santos
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Campos
Amazónicos, 0–500 m.
Dept.: LP.
Muestra: *R. Haase 74* (LPB).

Drosera communis A. St.-Hil., Pl.

Usuel. Bras. 3: t. XV(1). 1824.
Ref.: Correa A. & Silva (2005), Wood
et al. (2011).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Húmedo, Campos Cerrados, 0–1000 m.
Dept.: LP, SC.
Muestra: *S.G. Beck 18391* (LPB, M).

Drosera hirtella A. St.-Hil., Hist. Pl.

Remarq. Bresil 1: 262–263. 1826.
Sin.: *Drosera montana* var. *hirtella* (A.
St.-Hil.) Diels
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque
Semideciduo Chiquitano, Campos
Cerrados, 500–1000 m.
Dept.: SC.
Muestra: *J.R.I. Wood 27200* (K, LPB,
USZ).
Infra: *Drosera hirtella* var. *lutescens* A.
St.-Hil.

Drosera montana A. St.-Hil., Hist.

Pl. Remarq. Bresil 1: 260. 1826.
Ref.: Foster (1958), Killeen &
Schulenberg (1998), Correa A. &
Silva (2005).
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Bosque
Serrano Chaqueño, 1500–2500 m.
Dept.: CH, LP, SC, TA.
Muestra: *T.B. Miranda et al. 721* (LPB,
MO).

Infra: *Drosera montana* var. *montana*

Drosera sessilifolia A. St.-Hil., Hist.

Pl. Remarq. Bresil 1: 259. 1826.
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998),
Correa A. & Silva (2005).
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Campos
Cerrados, Sabanas Benianas del Norte,
Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.
Dept.: SC.
Muestra: *E. Gutiérrez C. et al. 1043*
(MO, USZ).

[Drosera villosa A. St.-Hil.], Hist.

Pl. Remarq. Bresil 1: 267. 1826.
Ref.: Schulenberg & Awbrey (1997),
Serrano & Terán (1998 [2000]),
Correa A. & Silva (2005).
Nota: El registro se basa en material
mal identificado de *D. montana*. *D.*
villosa es endémica del Brasil.

EBENACEAE Gürke, Nat.

Pflanzenfam. 4(1): 153. 1891.

Por B. Wallnöfer (W) y E. Chávez
(USZ); revisado por P.E. Berry
(MICH), S.G. Beck (LPB), M. Nee
(NY), P.M. Jørgensen (MO).
2 géneros, 15 especies, 2 especies
endémicas.

Diospyros L., Sp. Pl. 2: 1057–

1058. 1753.
14 especies, 2 especies endémicas.