

**Sinningia sellovii (Mart.) Wiehler**,  
Selbyana 5(1): 72. 1978.  
Sin.: *Gesneria sellovii* Mart.,  
*Rechsteineria sellovii* (Mart.) Kuntze,  
*Corytholoma sellovii* (Mart.) Kuntze,  
*Rechsteineria ramboi* Hoehne  
Ref.: Chautems (1993).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes.  
Bosque Húmedo, Yungas, Bosque  
Serrano Chaqueño, 0–3000 m.  
Dept.: CH, CO, LP, SC.  
Muestra: *M.A. Lewis 40431* (LPB, MO).

**Sinningia sulcata (Rusby) Wiehler**,  
Selbyana 5(1): 72. 1978.  
Sin.: *Gesneria sulcata* Rusby,  
*Rechsteineria sulcata* (Rusby) Fritsch  
Ref.: Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas,  
Bosque Serrano Chaqueño, 1000–  
3000 m.  
Dept.: CH, CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *M. Bang 629* (HT: NY;  
IT: GH, K, MO-1997258, PH, US),  
*S.G. Beck 9356* (LPB, US).

**Sinningia warmingii (Hiern)**  
**Chautems**, *Candollea* 45: 386. 1990.  
Sin.: *Gesneria rutila* var. *atrosanguinea*  
Lindl., *Gesneria lindleyi* Hook.,  
*Corytholoma lindleyi* (Hook.)  
Decne., *Gesneria warmingii* Hiern,  
*Rechsteineria atrosanguinea* (Lindl.)  
Kuntze, *Corytholoma sceptrum*  
var. *arenosa* Chodat & Hassl.,  
*Rechsteineria lindleyi* (Hook.) Fritsch,  
*Rechsteineria multiflora* Fritsch,  
*Rechsteineria stenantha* Fritsch,  
*Rechsteineria weberbaueri* Fritsch,  
*Rechsteineria microphylla* Fritsch,  
*Rechsteineria peruviana* Fritsch,  
*Corytholoma multiflorum* (Fritsch)  
Hassl., *Rechsteineria warmingii* (Hiern)  
Hjelmq., *Rechsteineria lindleyi* var.  
*macrophylla* Hoehne, *Rechsteineria*  
*schlickmannii* Hoehne, *Corytholoma*  
*warmingii* (Hiern) Toursark., *Sinningia*  
*claybergiana* H.E. Moore  
Ref.: Foster (1958).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque  
Húmedo, Bosque Semideciduo  
Chiquitano, 0–1000 m.  
Dept.: SC, TA.  
Muestra: *T. Killeen 1445* (F).

**GOUPIACEAE Miers**, *Ann. Mag.*  
*Nat. Hist.*, ser. 3 9: 292. 1862.  
Por R. Liesner (MO); revisado por  
S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M.  
Jørgensen (MO).  
1 género, 1 especie, 0 especies  
endémicas.

**Goupia Aubl.**, *Hist. Pl. Guiane* 1:  
295, pl. 116. 1775.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Goupia glabra Aubl.**, *Hist. Pl.*  
*Guiane* 1: 296, pl. 116. 1775.  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque  
Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: PA.  
Muestra: *L. Vargas et al. 948* (F, MO,  
NY, USZ).

**GROSSULARIACEAE DC.**, *Fl.*  
*Franç.* (ed. 3) 4(2): 405. 1805.

Por M. Weigend (BONN); revisado por  
S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M.  
Jørgensen (MO).  
1 género, 7 especies, 2 especies  
endémicas.

**Ribes L.**, *Sp. Pl.* 1: 200–202. 1753.  
7 especies, 2 especies endémicas.

**[Ribes albifolium Ruiz & Pav.]**, *Fl.*  
*Peruv.* 3: 12, t. 232. 1802.  
Ref.: Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material  
mal identificado de *R. bolivianum*.

**Ribes bolivianum Jancz.**, *Bull. Int.*  
*Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math.*  
1905: 759. 1905.  
Ref.: Foster (1958), Weigend & Binder  
(2001).  
Arbusto. Nativa. Andes. Yungas,  
Páramo Yungueño, 3000–4000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *G. Mandon 599* (LT:  
G; ILT: BM, F, GH, P), *S.G. Beck*  
*11101* (LPB, M, MO).

**Ribes brachybotrys (Wedd.) Jancz.**,  
*Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl.*  
*Sci. Math.* 1905: 759. 1905.  
Sin.: *Ribes viscosum* var. *brachybotrys*  
Wedd.  
Ref.: Foster (1958), Weigend & Binder  
(2001).  
Arbusto. Nativa. Andes. Altiplano.  
Yungas, Valles Secos, Puna Húmeda,  
Bosque de *Polylepis*, 3000–4000 m.  
Dept.: CO, LP, PO.  
Muestra: *S.G. Beck 8963* (LPB, M, MO).

**Ribes catamarcanum Jancz.**, *Bull.*  
*Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci.*  
*Math.* 1905: 762. 1905.  
Ref.: Weigend & Binder (2001).  
Arbusto. Nativa. Andes. Yungas,  
Bosque Tucumano-Boliviano, 3000–  
4500 m.  
Dept.: CH, SC.

Muestra: *I.G. Vargas & A.F. Fuentes C.*  
*3048* (NY).

**[Ribes glandulosum Ruiz & Pav.]**,  
*Fl. Peruv.* 3: 13, pl. 233. 1802.  
Ref.: Rusby (1893b), Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material  
mal identificado de *R. brachybotrys*.

**Ribes incarnatum Wedd.**, *Chlor.*  
*Andina* 2: 215. 1857.  
Ref.: Weigend & Binder (2001).  
Arbusto. Nativa. Andes. Yungas,  
Páramo Yungueño, 3500–4500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *S.G. Beck 21531* (LPB, M).

**Ribes pentlandii Britton**, *Mem.*  
*Torrey Bot. Club* 3(3): 26–27. 1893.  
Ref.: Rusby (1893b), Foster (1958),  
Weigend & Binder (2001), Ministerio de  
Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]).  
Arbusto. Endémica. Andes. Valles  
Secos, 3500–4000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *M. Bang 798* (LT: BM;  
ILT: F, G, GH, MO, NY, NY, US,  
US), *J.C. Solomon 7454* (MO).

**Ribes steinbachiorum Weigend &**  
**Binder**, *Bot. Jahrb. Syst.* 123(1):  
124, f. 3, H–L. 2001.  
Ref.: Weigend & Binder (2001).  
Arbusto. Endémica. Andes. Yungas,  
Páramo Yungueño, 2500–4500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *J. Steinbach 5015* (HT:  
NY; IT: G, GH, LPB, MO), *M.A.*  
*Lewis 881657* (LPB, MO).

**Ribes sucheziense Jancz.**, *Bull. Int.*  
*Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math.*  
1906: 8. 1906.  
Ref.: Weigend & Binder (2001).  
Arbusto. Nativa. Andes. Altiplano.  
Valles Secos, Puna Húmeda, 3000–  
4500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *A. Weberbauer 1006*  
(HT: G; IT: B, F), *S.G. Beck 14351*  
(LPB, M, MO).

**GUNNERACEAE Meisn.**, *Pl. Vasc.*  
*Gen.* 1: 345, 346, 2: 257. 1836–1843.

Por L. E. Mora-Osejo† (COL) y S.G.  
Beck (LPB); revisado por M. Nee  
(NY), P.M. Jørgensen (MO).  
1 género, 9 especies, 1 especie  
endémica.

**Gunnera L.**, *Syst. Nat.* (ed. 12) 2:  
587, 597. 1767.  
9 especies, 1 especie endémica.