

**Gunnera annae Schindl.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 124–125. 1911.  
Ref.: Foster (1958), Macbride (1959c), Brako & Zarucchi (1993b), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2000–4000 m.  
Dept.: LP, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 7787* (COL, LPB, OS).  
Nom. Vern.: Quirisulla.

**Gunnera apiculata Schindl.**, Pflanzenr. IV. 225(Heft 23): 121. 1905.  
Sin.: *Gunnera chilensis* A. DC.  
Ref.: Foster (1958), Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Zuloaga & Morrone (1999a), Serrano & Terán (1998 [2000]), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba, acuática. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 2000–3500 m.  
Dept.: CH, LP, SC, TA.  
Tipo y muestra: *G. Mandon 598* (HT: G; IT: K, NY, P, S), *J.C. Solomon 13092* (COL, LPB, MO).  
Nota: Sinonimia de acuerdo a Mora-Osejo et al. (2011).  
Nom. Vern.: Kirusilla.

**Gunnera berteroi Phil.**, Anales Univ. Chile 714. 1872.  
Ref.: Schindler (1905), Marticorena & Quezada (1985), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2500–3500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 5175* (LPB, MO).

**Gunnera boliviana Morong ex Rusby**, Mem. Torrey Bot. Club 6: 33. 1896.  
Ref.: Schindler (1905), Foster (1958), Biloni (1959).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1000–3000, 3500–4000 m.  
Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.  
Tipo y muestra: *M. Bang 1214* (HT: US; IT: BM, F, G, GH, K, NY), *S.G. Beck 7064* (COL, LPB, OS).  
Nom. Vern.: Quirisulla.

**Gunnera magellanica Lam.**, Encycl. 3: 61, t. 801, f. 2. 1789.  
Sin.: *Misandra magellanica* (Lam.) J.F. Gmel.  
Ref.: Foster (1958), Macbride (1959c), Mora-Osejo (1984), Marticorena & Quezada (1985), Jørgensen & Ulloa

(1994), Mora-Osejo (1999a), Zuloaga & Morrone (1999a), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba. Nativa. Andes, Altiplano. Yungas, Páramo Yungueño, Puna Húmeda, 3000–4000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *S.G. Beck 11847* (BOLV, COL, LPB, M, NY).

**Gunnera margaretae Schindl.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 125. 1911.  
Ref.: Biloni (1959), Macbride (1959c), Brako & Zarucchi (1993b), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3500 m.  
Dept.: LP, SC.  
Muestra: *M.A. Lewis 881139* (LPB, MO).  
Nota: Citado en Mora-Osejo et al. (2011), bajo *López-Jaramillo s.n.*

**Gunnera peruviana J.F. Macbr.**, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(1): 31–32. 1931.  
Ref.: Macbride (1959c), Brako & Zarucchi (1993b), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 3500–4000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *J.C. Solomon & S.G. Beck 6648* (LPB, MO).

**Gunnera pilosa Kunth**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 44. 1817.  
Ref.: Schindler (1905), Foster (1958), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2500–3500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *G.H.H. Tate 717* (LPB, NY).

[**Gunnera scabra Ruiz & Pav.**], Fl. Peruv. 1: 29, t. 44, f. a. 1798.  
Ref.: Foster (1958), López Vargas (1995), Saravia Miranda (1996), Mora-Osejo et al. (2011).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *G. annae*.

**Gunnera schindleri L.E. Mora**, Mutisia 45: 5. 1978.  
Ref.: Zuloaga & Morrone (1999a), Mora-Osejo et al. (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Bosque Tucumano-Boliviano, 1500–2000 m.  
Dept.: CH, TA.  
Tipo y muestra: *J. West 8324* (HT: GH; IT: LPB no localizado), *M. Serrano et al. 6897* (HSB, MO, S).

**HAEMODORACEAE R. Br.**, Prodr. 299. 1810.

Por P.M. Jørgensen (MO); revisado por P.J.M. Maas (L), M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB).  
2 géneros, 2 especies, 0 especies endémicas.

**Schiekia Meisn.**, Pl. Vasc. Gen. 2(12): 300. 1842.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Schiekia orinocensis (Kunth) Meisn.**, Pl. Vasc. Gen. 2(12): 300. 1842.  
Sin.: *Wachendorfia orinocensis* Kunth, *Troschelia orinocensis* (Kunth) Klotzsch & M.R. Schomb., *Schiekia flavescens* Maury  
Ref.: Maas & Maas van de Kamer (1993), Killeen & Schulenberg (1998).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, 0–1000 m.  
Dept.: BE, SC.  
Muestra: *E. Gutiérrez et al. 1098* (MO, USZ).  
Infra: *Schiekia orinocensis* subsp. *orinocensis*

**Xiphidium Aubl.**, Hist. Pl. Guiane 1: 33, pl. 11. 1775.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Xiphidium caeruleum Aubl.**, Hist. Pl. Guiane 1: 33, pl. 11. 1775.  
Sin.: *Ixia xiphidium* Loefl., *Xiphidium coeruleum* Aubl., *Xiphidium floribundum* Sw., *Xiphidium albidum* Lam., *Xiphidium album* Willd., *Xiphidium rubrum* D. Don, *Xiphidium foceanum* Miq., *Xiphidium giganteum* Lindl., *Xiphidium floribundum* var. *albiflorum* Hook., *Xiphidium floribundum* var. *caeruleum* (Aubl.) Hook., *Eccremis scabra* Kuntze  
Ref.: Foster (1958), Parker & Bailey (1991), Maas & Maas van de Kamer (1993).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 789* (CTES, HSB, LPB, MO, USZ).

**HALORAGACEAE R. Br.**, Voy. Terra Austral. 2: 549. 1814.

Por S.G. Beck (LPB); revisado por M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
2 géneros, 3 especies, 0 especies endémicas.