

*bakereanum* (Britton) G. Schellenb.  
Ref.: Pennington et al. (1981), Moraes R. (1990), Parker & Bailey (1991), Quevedo Sopepi (1993c), Alverson et al. (2000).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *J.C. Solomon 10874* (LPB, MO).  
Infra: *Trichilia quadrijuga* subsp. *quadrijuga*

**Trichilia rubra C. DC.**, Fl. Bras. 11(1): 203. 1878.  
Ref.: Pennington et al. (1981), Quevedo Sopepi (1993c).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA.  
Muestra: *A.H. Gentry et al. 70776* (LPB, MO).

**Trichilia septentrionalis C. DC.**, Fl. Bras. 11(1): 220. 1878.  
Ref.: Parker & Bailey (1991), Quevedo Sopepi (1993c), Alverson et al. (2000), Montambault (2002).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: LP, PA.  
Muestra: *A.H. Gentry & S. Estessoro C. 70425* (BOLV, LPB, MO, NY, QCNE, USZ).

**Trichilia singularis C. DC.**, Fl. Bras. 11(1): 217. 1878.  
Ref.: Pennington et al. (1981), Quevedo Sopepi (1993c).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, PA, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 5226* (COL, CTES, HBG, K, LPB, M, MO, NY, QCNE, USZ).

[**Trichilia solitudinis Harms**], Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 10: 247. 1928.  
Ref.: Parker & Bailey (1991), Killeen & Schulenberg (1998).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Trichilia stellatotomentosa Kuntze**, Revis. Gen. Pl. 3(3): 36. 1898.  
Sin.: *Trichilia stellipila* C. DC.  
Ref.: Foster (1958), Pennington et al. (1981), Quevedo Sopepi (1993c), Jardim et al. (2003).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Sabanas Benianas del Sur, 0–1000 m.  
Dept.: BE, SC.  
Muestra: *M.H. Nee 39920* (LPB, MO, NY, USZ).  
Nom. Vern.: Sama.

**Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC.**, Monogr. Phan. 1: 679–680. 1878.  
Sin.: *Moschoxylum surinamense* Miq.  
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Trichilia tomentosa Kunth**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 215–216. 1821 [1822].  
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).  
Arbolito, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 260* (LPB, MO).

**Trichilia trollii Harms**, Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 11: 385. 1932.  
Ref.: Foster (1958).  
Arbusto, árbol. Endémica. Andes. Yungas, 3000–3500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo: *W. Troll 2847* (HT: B destr.).  
Nota: Conocido solamente del tipo. La identidad de la especie queda incierta.

**MELIANTHACEAE Horan.**, Prim. Lin. Syst. Nat. 100. 1834.  
Por S.G. Beck (LPB); revisado por M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

**Melianthus L.**, Sp. Pl. 2: 639. 1753.  
1 especie, 0 especies endémicas.  
**Melianthus major L.**, Sp. Pl. 2: 939[639]. 1753.  
Subarbusto. Naturalizada, cultivada. Andes. Valles Secos, 2500–3500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *S.G. Beck 24922* (BOLV, LPB, M).

**MENDONCIACEAE Bremek.**, Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., C 56: 540. 1954.

Nota: Parte de Acanthaceae (APG III 2009).

**MENISPERMACEAE Juss.**, Gen. Pl. 284–285. 1789.

Por R. del C. Ortiz (MO); revisado por S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
12 géneros, 42 especies, 0 especies endémicas.

**Abuta Aubl.**, Hist. Pl. Guiane 1: 618, pl. 250. 1775.  
8 especies, 0 especies endémicas.

**Abuta antioquiana Krukoff & Barneby**, Mem. New York Bot. Gard. 20: 24–25. 1970.  
Liana. Nativa. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *A.H. Gentry et al. 44284* (LPB, MO).  
Nota: Identificación provisional. Con certeza conocida solamente del tipo de Antioquia, Colombia.

[**Abuta candollei Triana & Planch.**], Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 17: 47. 1862.  
Ref.: Krukoff & Moldenke (1938), Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *A. rufescens*.

**Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith**, Bull. Misc. Inform. Kew 1937: 397. 1937.  
Sin.: *Cocculus grandifolius* Mart., *Abuta concolor* Poepp. & Endl., *Abuta concolor* Benth.  
Ref.: Krukoff & Moldenke (1938), Foster (1958), Moraes R. (1990), Parker & Bailey (1991), Torrico Pardo (1993e), Killeen & Schulenberg (1998), Alverson et al. (2000).  
Liana, arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, 0–1000 m.  
Dept.: BE, LP, PA, SC.  
Muestra: *I.G. Vargas et al. 2698* (F, MO, USZ).  
Nom. Vern.: Fruta de ciento pie, nuririjaja (Tacana), odó odó, pitón.

**Abuta imene (Mart.) Eichler**, Flora 47: 389. 1864.  
Sin.: *Cocculus imene* Mart., *Hyperbaena trinervis* Rusby, *Abuta trinervis* (Rusby) Moldenke  
Ref.: Torrico Pardo (1993e).  
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.  
Dept.: BE, LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 7892* (LPB, MO).

**Abuta myctandra Krukoff & Barneby**, Mem. New York Bot. Gard. 22(2): 45, f. 2. 1971.  
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE.  
Muestra: *D.C. Daly et al. 6596* (LPB, MO, NY).