

Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas.
Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.
Dept.: PA.
Muestra: *A.H. Gentry & A. Perry*
77907 (MO, USZ).

Infra: *Sorocea pubivena* subsp. *hirtella*
(Mildbr.) C.C. Berg, *Sorocea pubivena*
subsp. *oligotricha* (Akkermans & C.C.
Berg) C.C. Berg

Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr.,
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot.
Ser. 11(1): 16. 1931.

Sin.: *Pseudosorocea sprucei* Baill.,
Sorocea saxicola Hassl., *Sorocea*
saxicola fo. *subrepanda* Hassl., *Sorocea*
saxicola var. *dentata* Hassl., *Trophisomia*
edulis Rojas Acosta, *Guatteria cuspidata*
Rusby, *Olmedia virgata* Pittier, *Sorocea*
arnoldoi Lanj. & Wess. Boer

Ref.: Foster (1958), Cornejo Guzmán
& Rebolledo Garín (1993), Killeen
& Schulenberg (1998), Berg (2001),
Jardim et al. (2003).

Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas.
Bosque Húmedo, Bosque Seco
Chaqueño, Sabanas Benianas del Sur,
0–500 m.
Dept.: BE, SC.

Muestra: *M.H. Nee 35813* (LPB, MO,
NY).

Infra: *Sorocea sprucei* subsp. *sprucei*,
Sorocea sprucei subsp. *saxicola*
(Hassl.) C.C. Berg

Nom. Vern.: Bibosicillo, iraisi, sapito.

Sorocea steinbachii C.C. Berg,
Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.,
C 88(4): 385, 387, f. 5/3. 1985.

Ref.: Cornejo Guzmán & Rebolledo
Garín (1993), Alverson et al. (2000),
Arrázola Rivero et al. (2000), Berg
(2001), Nee (2004).

Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas.
Bosque Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Tipo y muestra: *J. Steinbach 7356*
(HT: U; IT: B, BM, G, GH, K, MO-
941176, NY), *R. Seidel 2181* (BG,
LPB, MO, SI).

Trophis P. Browne, Civ. Nat. Hist.
Jamaica 357–358, t. 37, f. 1. 1756.
1 especie, 0 especies endémicas.

Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg,
Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.,
C 91(4): 354. 1988.
Sin.: *Olmedia aspera* Ruiz & Pav.,
Olmedia aspera Poepp. & Endl.,
Olmedia poeppigiana Klotzsch,
Trophis aurantiaca Herzog, *Olmedia*
caucana Pittier, *Olmedia falcifolia*
Pittier

Ref.: Berg (1972), Parker & Bailey
(1991), Cornejo Guzmán &
Rebolledo Garín (1993), Berg (2001),
Nee (2004).

Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas.
Bosque Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, CO, LP, SC.

Muestra: *B.A. Krukoff 10277* (K, LPB,
MO, NY, UC, US).

Nom. Vern.: Oño oño, shaksi,
tenemura.

MORINGACEAE Martinov,
Tekhno-Bot. Slovar. 404. 1820.

Por M. Nee (NY) y M. Saldias (USZ),
revisado por S.G. Beck (LPB) y P.M.
Jørgensen (MO).

1 género, 1 especie, 0 especies
endémicas.

Moringa Adans., Fam. Pl. 2: 318.
1763.

1 especie, 0 especies endémicas.

Moringa oleifera Lam., Encycl.

1(2): 398. 1785.

Árbol. Cultivada. Zonas Bajas. 0–500 m.
Dept.: SC.

Muestra: *M. Saldias P. et al. 7001* (USZ).

MUNTINGIACEAE C. Bayer,

M.W. Chase & M.F. Fay, Taxon
47(1): 38. 1998.

Por S. Arrázola (BOLV); revisado por
M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M.
Jørgensen (MO).

1 género, 1 especie, 0 especies
endémicas.

Muntingia L., Sp. Pl. 1: 509. 1753.
1 especie, 0 especies endémicas.

Muntingia calabura L., Sp. Pl. 1:
509. 1753.

Ref.: Foster (1958), Moraes R. (1990),
Parker & Bailey (1991), Antezana
Valera (1993b), Schulenberg &
Awbrey (1997), Mostacedo C. &
Uslar (1999), Alverson et al. (2000),
Serrano & Terán (1998 [2000]),
Navarro Sánchez & Maldonado
(2002), Nee (2008), Arroyo Padilla &
Villarreal Segarra (2009).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas
Bajas, Andes. Bosque Húmedo,
Bosque Seco Chaqueño, Yungas,
0–1500 m.

Dept.: BE, CH, LP, PA, SC, TA.

Muestra: *M.H. Nee 39783* (LPB, MO,
NY).

Nom. Vern.: Ovillo, uvilla, uvillo.

MUSACEAE Juss., Gen. Pl. 61. 1789.

Por P.M. Jørgensen (MO); revisado por
M. Nee (NY) y S.G. Beck (LPB).
1 género, 4 especies, 0 especies
endémicas.

Musa L., Sp. Pl. 2: 1043. 1753.
4 especies, 0 especies endémicas.

Musa acuminata Colla, Mem. Reale
Accad. Sci. Torino 25: 394–395.
1820.

Ref.: Valenzuela Celis (1993c).

Hierba. Cultivada. Andes. Yungas,
1500–2000 m.

Dept.: Bolivia.

Muestra: *Errboe s.n.* (LPB).

Nom. Vern.: Plátano, banana, guineo.

Musa balbisiana Colla, Mem. Reale
Accad. Sci. Torino 25: 384–385.
1820.

Ref.: Valenzuela Celis (1993c).

Hierba. Cultivada. Región, tipo de
vegetación y elevación desconocidas.

Dept.: Bolivia.

Nom. Vern.: Plátano de freír, plátano

turco, plátano de cocinar, postre.

Musa ×paradisica L., Sp. Pl. 2:
1043. 1753.

Hierba. Cultivada. Zonas Bajas, Andes.
Bosque Húmedo, Campos Cerrados,
Yungas, 0–1500 m.

Dept.: CO, LP, SC.

Muestra: *M.H. Nee 44322* (LPB, MO,
NY, USZ).

Musa velutina H. Wendl. & Drude,
Gartenflora 24: 65–67, t. 823. 1875.

Hierba. Cultivada. Zonas Bajas.

Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: CO.

Muestra: *E. Thomas 668* (LPB).

MYRICACEAE Rich. ex Kunth, Nov.
Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 16. 1817.

Por C. Parra-O. (COL); revisado por S.
Lægaard (AAU), S.G. Beck (LPB),
M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).

2 géneros, 2 especies, 0 especies
endémicas.

Morella Lour., Fl. Cochinch. 537,
548. 1790.

2 especies, 0 especies endémicas.

Morella chevalieri Parra-O.,

Brittonia 52(4): 321–323, f. 1. 2000.

Sin.: *Myrica pubescens* var. *glabra* Chev.

Ref.: López Vargas (1995), Parra-Osorio
(2000 [2001]), Beck et al. (2001), Parra-