

- et al. (2000), Bonifaz & Cornejo Sotomayor (2002), Jardim et al. (2003), Wood et al. (2011).
Arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Campos Cerrados, Sabanas Benianas del Norte, Campos Amazónicos, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–2000 m.
Dept.: BE, CH, LP, PA, SC.
Muestra: *J.C. Solomon 7890* (LPB, MO).
Nom. Vern.: Carne de lata.
- Roupala obtusata Klotzsch**,
Linnaea 15: 54. 1841.
Sin.: *Roupala angustifolia* Diels
Ref.: Sleumer (1954), Killeen & Schulenberg (1998).
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, 0–500 m.
Dept.: SC.
Muestra: *R. Guillén V. & P. Solíz 3823* (GUAY, K, LPB, MO, USZ).
- Roupala steinbachii Sleumer**, Bot. Jahrb. Syst. 76(2): 157. 1954.
Ref.: Sleumer (1954), Vargas Salazar (1993f).
Árbol. Endémica. Andes. Valles Secos, 2000–2500 m.
Dept.: CO.
Tipo: *J. Steinbach 5830* (HT: B; IT: A, GH, K, LIL, MO-911187).
Nota: Conocido solamente del tipo.
- PUNICACEAE Bercht. & J. Presl**,
Pfir. Rostlin 2(94): [378]. 1825.
Nota: Parte de Lythraceae (APG III 2009).
- PUTRANJIVACEAE Meisn.**, Pl. Vasc. Gen. t. diagn. 345, Comm. 258. 1842.
Por G.L. Webster† (DAV); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), A.F. Fuentes C. (LPB), P.M. Jørgensen (MO).
1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.
- Drypetes Vahl**, Eclog. Amer. 3: 49. 1807.
1 especie, 0 especies endémicas.
- Drypetes amazonica Steyerm.**, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(5): 420. 1938.
Ref.: Macbride (1951), Parker & Bailey (1991), Vargas Caballero (1993).
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.
Dept.: BE, LP, SC.
Muestra: *C.B. Maldonado et al. 1669* (LPB, MO).
- Infra: *Drypetes amazonica* var. *peruviana* J.F. Macbr.
- [Drypetes gentryi Grández & Vásquez]**, Arnela 9(2): 72. 2003.
Ref.: Alverson et al. (2000), Vásquez Martínez et al. (2002 [2003]).
Nota: Especie dudosa. *Nom. nud.*
- [Drypetes maguireana Monach.]**, Phytologia 3: 33. 1948.
Ref.: Vargas Caballero (1993).
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *Chaetocarpus myrsinites* var. *stipularis*.
- QUILLAJACEAE D. Don**, Edinburgh New Philos. J. 10: 229. 1831.
Por R.I. Meneses (LPB); revisado por S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).
1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.
- Quillaja Molina**, Sag. Stor. Nat. Chili 175–176, 354–355. 1782.
1 especie, 0 especies endémicas.
- Quillaja saponaria Molina**, Sag. Stor. Nat. Chili 175–176, 354. 1782.
Ref.: Foster (1958), Anze Martín (1993).
Árbol. Cultivada. Andes. Yungas, 2000–2500 m.
Dept.: LP.
Muestra: *H.H. Rusby 728* (NY).
Nom. Vern.: Árbol de jabón, charaña, palo de jabón, quillay.
- RAFFLESIACEAE Dumort.**, Anal. Fam. Pl. 13–14. 1829.
Nota: Véase Apodanthaceae.
- RANUNCULACEAE Juss.**, Gen. Pl. 231. 1789.
Por S.G. Beck (LPB) y J. Shortt (LPB); revisado por M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).
9 géneros, 37 especies, 4 especies endémicas.
- Anemone L.**, Sp. Pl. 1: 538. 1753.
1 especie, 0 especies endémicas.
- Anemone decapetala Ard.**, Syst. Nat. 27. 1764.
Sin.: *Anemone triternata* Vahl
Ref.: Lourteig (1951 [1952]), Lourteig (1956), Foster (1958), Ruiz (2001), Lehnebach (2008), Ehrendorfer et al. (2009).
- Hierba. Nativa. Andes, Altiplano. Valles Secos, Puna Húmeda, Bosque de *Polylepis*, 2500–3000, 3500–4000 m.
Dept.: CO, LP, TA.
Muestra: *E. Fernández T. 287* (BOLV, LPB).
Infra: *Anemone decapetala* var. *foliolosa* Eichler
- Aquilegia L.**, Sp. Pl. 1: 533. 1753.
2 especies, 0 especies endémicas.
- Aquilegia chrysantha A. Gray**, Proc. Amer. Acad. Arts 8: 621. 1873.
Ref.: Bailey (1949).
Hierba. Cultivada. Andes. Valles Secos, 3000–3500 m.
Dept.: LP.
Muestra: *J.C. Solomon 12777* (LPB, MO).
- Aquilegia vulgaris L.**, Sp. Pl. 1: 533. 1753.
Ref.: Ruiz (2001).
Hierba. Cultivada. Andes, Altiplano. Valles Secos, Puna Seca, 3000–4000 m.
Dept.: OR.
Muestra: *R. Zeballos & M.R. Zeballos 3117* (LPB).
- Caltha L.**, Sp. Pl. 1: 558. 1753.
1 especie, 0 especies endémicas.
- Caltha sagittata Cav.**, Icon. 5: 8, t. 414. 1799.
Sin.: *Caltha alata* A.W. Hill, *Caltha involuta* A.W. Hill
Ref.: Lourteig (1956), Foster (1958), Beck & Valenzuela Celis (1991).
Hierba. Nativa. Andes, Altiplano. Valles Secos, Puna Húmeda, 4000–5000 m.
Dept.: LP.
Muestra: *S.G. Beck 1959* (LPB, M, P).
- Clematis L.**, Sp. Pl. 1: 543. 1753.
7 especies, 1 especie endémica.
- Clematis alborosea Ulbr.**, Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 8: 325. 1923.
Ref.: Lourteig (1956), Foster (1958), Shortt (2004).
Liana. Nativa. Andes, Altiplano. Yungas, Valles Secos, Puna Húmeda, Puna Seca, 2000–4000 m.
Dept.: CH, CO, PO.
Muestra: *J. Steinbach 6032* (F, G, K, LIL, LPB, SI).
- Clematis campestris A. St.-Hil.**, Fl. Bras. Merid. (quarto ed.) 1: 4. 1824.
Sin.: *Clematis triloba* var. *guaranitica* A. St.-Hil., *Clematis denticulata* Vell., *Clematis montevidensis* Spreng., *Clematis triloba* A. St.-Hil., *Clematis*