

TOVARIACEAE Pax, Nat.

Pflanzenfam. 3(2): 207. 1891.

Por E. Feltz (MO); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

Tovaria Ruiz & Pav., Fl. Peruv.

Prodr. 49, t. 8. 1794.

1 especie, 0 especies endémicas.

Tovaria pendula Ruiz & Pav., Syst.

Veg. Fl. Peruv. Chil. 85. 1798.

Sin.: *Bancroftia pendula* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Ref.: Foster (1958), Andersson (1995), Castillo Campos (1996).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–3500 m.

Dept.: CO, LP.

Muestra: *D.N. Smith & J.F. Smith 12926* (BOLV, LPB, MO).

TRIGONIACEAE A. Juss., Dict.

Univ. Hist. Nat. 12: 670. 1849.

Por M. Nee (NY); revisado por S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

1 género, 5 especies, 1 especie endémica.

Trigonía Aubl., Hist. Pl. Guiane 1:

387–388, pl. 149. 1775.

5 especies, 1 especie endémica.

Trigonía boliviana Warm., Fl.

Bras. 13(2): 134. 1875.

Sin.: *Trigonía simplex* var. *pilosula* Kuntze

Ref.: Foster (1958), Lleras (1978).

Trepadora. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Seco Chaqueño, Valles Secos, 0–1500 m.

Dept.: CH, LP, SC.

Tipo y muestra: *W.A. Cumming 214* (HT: W; IT: F), *M.H. Nee 47828* (LPB, MO, NY).

Trigonía floccosa Rusby, Bull. New

York Bot. Gard. 4: 325. 1907.

Sin.: *Trigonía echiteifolia* Rusby

Ref.: Foster (1958), Lleras (1978).

Trepadora, arbusto. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2000 m.

Dept.: LP.

Tipo y muestra: *M. Bang 2191* (HT: NY; IT: E, G, GH, M, MICH,

MO-1715729, US, W), *P. Acevedo-Rodríguez et al. 4441* (LPB, MO, NY).

Trigonía killipii J.F. Macbr., Publ.

Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/3): 951. 1950.

Trepadora, arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, PA.

Muestra: *B.M. Boom 4972* (LPB, NY).

Trigonía laevis Aubl., Hist. Pl.

Guiane 1: 390, t. 150. 1775.

Sin.: *Trigonía parviflora* Benth., *Trigonía microcarpa* Sagot ex Warm., *Trigonía bicolor* Suess. & Overkott

Ref.: Foster (1958), Lleras (1978),

Killeen & Schulenberg (1998).

Trepadora. Nativa. Zonas Bajas.

Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, 0–1000 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Muestra: *J.C. Solomon 7979* (AAU, F, K, LPB, MO, NY).

Infra: *Trigonía laevis* var. *microcarpa* (Sagot ex Warm.) Sagot

Trigonía prancei Lleras, Fl.

Neotrop. 19: 33, 35–36, f. 13. 1978.

Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: PA.

Muestra: *J.C. Solomon 16851* (AAU, F, LPB, MO, NY).

[Trigonía pubescens Cambess.], Fl.

Bras. Merid. (quarto ed.) 2: 114. 1829.

Ref.: Foster (1958).

Nota: El registro se basa en material mal identificado de *T. floccosa*.

[Trigonía sericea Kunth], Nov. Gen.

Sp. (quarto ed.) 5: 141. 1821 [1822].

Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).

Nota: El registro se basa en material mal identificado de *T. prancei*.

TRIURIDACEAE Gardner, Trans.

Linn. Soc. London 19: 160. 1843.

Por P.M. Jørgensen (MO); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB).

2 géneros, 2 especies, 1 especies endémicas.

Triuridopsis H. Maas & Maas,

Pl. Syst. Evol. 192: 257–262, f. 1. 1994.

1 especie, 1 especies endémicas.

Triuridopsis intermedia T. Franke,

Beenken & C. Hahn, Pl. Syst.

Evol. 225: 141–144, f. 1. 2000.

Ref.: Franke et al. (2000).

Hierba. Endémica. Zonas Bajas.

Bosque Húmedo, 500–1000 m.

Dept.: LP.

Tipo: *L. Beenken & C. Hahn 1051* (HT: M; IT: LPB, U).

Nota: Conocido solamente del tipo.

Triuris Miers, Proc. Linn. Soc.

Lond. 1: 96. 1841.

1 especie, 0 especies endémicas.

Triuris hyalina Miers, Trans. Linn.

Soc. London 19: 79, t. 19. 1845.

Sin.: *Triuris major* Poulsen, *Triuris mycenoides* Ule

Ref.: Maas & Rübsamen (1986).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: LP.

Muestra: *A. Fuentes & V. Cardona 4151* (LPB).

Nota: Identificación tentativa.

TROPAEOLACEAE Juss. ex DC.,

Prodr. 1: 683. 1824.

Por P.M. Jørgensen (MO); revisado por S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY).

1 género, 14 especies, 7 especies endémicas.

Tropaeolum L., Sp. Pl. 1: 345. 1753.

14 especies, 7 especies endémicas.

Tropaeolum boliviense Loes., Bot.

Jahrb. Syst. 45(4): 462. 1911.

Ref.: Foster (1958), Adolfo María (1966), Sparre & Andersson (1991), De la Barra (1997), Serrano & Terán (1998 [2000]).

Trepadora. Endémica. Andes. Valles Secos, 1000–1500 m.

Dept.: CH, CO, TA.

Tipo y muestra: *K. Fiebrig 2698* (LT: S; ILT: BM, G, GH, LD, M, NY, SI, U, W; fotos: MA, MO ex B), *C. Antezana V. 743* (BOLV).

Nota: Citado como *T. bolivianum*

Rusby en Adolfo María (1966) y De la Barra (1997). Sparre & Andersson (1991) consideraban esta especie como conocida solamente del tipo.

Tropaeolum capillare Buchenau,

Bot. Jahrb. Syst. 15: 219. 1892.

Ref.: Sparre & Andersson (1991).

Hierba, trepadora. Nativa. Zonas Bajas,

Andes. Bosque Seco Chaqueño, Bosque Serrano Chaqueño, 500–1500 m.

Dept.: CH, TA.

Muestra: *J. Caballero G. et al. 185* (MO, USZ).