

**Triodanis Raf.**, New Fl. 4: 67.  
1836 [1838].  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Triodanis biflora (Ruiz & Pav.)**

**Greene**, Man. Bot. San Francisco Bay 230. 1894.

Sin.: *Campanula biflora* Ruiz & Pav.,  
*Specularia biflora* (Ruiz & Pav.)  
Fisch. & C.A. Mey., *Legousia biflora*  
(Ruiz & Pav.) Britton, *Triodanis*  
*perfoliata* var. *biflora* (Ruiz & Pav.)  
Bradley

Ref.: Bradley (1975).

Hierba. Nativa. Andes. Páramo  
Yungueño, 3000–3500 m.

Dept.: LP.

Muestra: *M.A. Lewis 88617* (LPB, MO).

**Wahlenbergia Schrad. ex Roth**,

Nov. Pl. Sp. 399. 1821.

2 especies, 0 especies endémicas.

**Wahlenbergia linarioides (Lam.) A.**

**DC.**, Monogr. Campan. 158. 1830.

Sin.: *Campanula linarioides* Lam.,  
*Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb.

Ref.: Foster (1958).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas,  
Andes. Bosque Húmedo, Bosque  
Semideciduo Chiquitano, Yungas,  
Bosque Tucumano-Boliviano,  
Bosque Serrano Chaqueño, Páramo  
Yungueño, Valles Secos, 0–500,  
1000–2500, 3000–4000 m.

Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.

Muestra: *J.C. Solomon 7208* (LPB, MO).

**Wahlenbergia peruviana A. Gray**,

Proc. Amer. Acad. Arts 5: 152. 1861.

Ref.: Foster (1958).

Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 3500–  
4000 m.

Dept.: CO, LP, TA.

Muestra: *I. Hensen 1583* (BOLV, LPB).

**CANNABACEAE Martinov**,

Tekhno-Bot. Slovar. 99. 1820.

Por E. Mayta (LPB) y C.C. Berg† (L);  
revisado por S.G. Beck (LPB), M.  
Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).

4 géneros, 10 especies, 0 especies  
endémicas.

**Cannabis L.**, Sp. Pl. 2: 1027. 1753.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Cannabis sativa L.**, Sp. Pl. 2: 1027.  
1753.

Hierba. Cultivada. Zonas Bajas, Andes.  
Tipo de vegetación desconocida,  
0–3500 m.

Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.

Muestra: *J.R. Abbott 16174* (LPB, MO).

**Celtis L.**, Sp. Pl. 2: 1043. 1753.

6 especies, 0 especies endémicas.

**Celtis australis L.**, Sp. Pl. 2: 1043.  
1753.

Ref.: López Calderón (1993d).

Árbol. Cultivada. Andes. Valles Secos,  
3000–3500 m.

Dept.: LP.

Muestra: *J.C. Solomon 15727* (LPB,  
MO, NY, USZ).

**Celtis brasiliensis (Gardner)**

**Planch.**, Ann. Sci. Nat., Bot., sér.  
3, 10: 310. 1848.

Sin.: *Mertensia brasiliensis* Gardner,  
*Celtis boliviensis* Planch., *Momisia*  
*crenata* Wedd., *Momisia flexuosa*  
Wedd., *Celtis crenata* (Wedd.) Miq.

Ref.: Foster (1958), Berg & Dahlberg  
(2001), Nee (2004).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas,  
Andes. Bosque Húmedo, Bosque  
Semideciduo Chiquitano, Valles  
Secos, 0–2500 m.

Dept.: BE, CH, LP, SC, TA.

Muestra: *M.H. Nee 33990* (LIL, LPB,  
MA, MO, NY, TEX, US).

Nom. Vern.: Chichipí, tala guiadora,  
tala satajchi, satajchi, yahuatáo.

**Celtis chichape (Wedd.) Miq.**, Fl.

Bras. 4(1): 181. 1853.

Sin.: *Momisia chichape* Wedd., *Celtis*  
*tala* var. *chichape* (Wedd.) Planch.,  
*Celtis tala* fo. *velutina* Herzog, *Celtis*  
*pubescens* var. *chichape* (Wedd.)  
Baehni

Ref.: López Vargas (1995), Berg &  
Dahlberg (2001), Nee (2004).

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes.  
Bosque Seco Chaqueño, Sabanas  
Benianas del Sur, Bosque Serrano  
Chaqueño, Valles Secos, 0–2500 m.

Dept.: BE, CH, CO, PO, SC.

Tipo y muestra: *H.A. Weddell 3610*  
(HT: P; IT: MPU, P; fotos: MO ex P),  
*J.C. Solomon 14727* (LPB, MO).

Nom. Vern.: Chichapí, chichapita,  
sartajchi, sataoche, uña de murciélago.

**Celtis ehrenbergiana (Klotzsch)**

**Liebmann**, Kongel. Danske Vidensk.  
Selsk. Skr., Naturvidensk. Math.

Afd., ser. 5 2: 339. 1851.

Sin.: *Momisia ehrenbergiana* Klotzsch,  
*Celtis tala* Gillies ex Planch.,  
*Celtis pallida* Torr., *Celtis tala* var.  
*weddelliana* Planch., *Celtis spinosa*  
var. *weddelliana* (Planch.) Baehni

Ref.: López Vargas (1995), Serrano  
& Terán (1998 [2000]), Berg &

Dahlberg (2001), Nee (2004).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas,  
Andes. Bosque Seco Chaqueño,  
Sabanas Benianas del Sur, Bosque  
Serrano Chaqueño, Valles Secos,  
0–3000 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, PO, SC, TA.

Muestra: *B. Mostacedo & A. Jiménez*  
*2537* (LPB, MO, NY, USZ).

Nom. Vern.: Chichapí, chipa satajchi,  
mistol, nu guaji, salomatero, satajchi.

**Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.**, Silva  
7: 64. 1895.

Sin.: *Celtis pubescens* var. *pubescens*,  
*Rhamnus iguanaea* Jacq., *Celtis*  
*pubescens* Spreng., *Celtis spinosa*  
Spreng., *Momisia triflora* Ruiz ex  
Klotzsch, *Celtis morifolia* Planch.,  
*Momisia tarijensis* Wedd., *Celtis*  
*triflora* (Ruiz ex Klotzsch) Miq.,  
*Celtis williamsii* Rusby

Ref.: Moraes R. (1990), Parker &  
Bailey (1991), López Calderón  
(1993d), Schulenberg & Awbrey  
(1997), Killeen & Schulenberg  
(1998), González et al. (1999),  
Mostacedo C. & Uslar (1999),  
Alverson et al. (2000), Serrano  
& Terán (1998 [2000]), Berg &  
Dahlberg (2001), Jardim et al. (2003),  
Nee (2004).

Liana, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes.  
Bosque Húmedo, Yungas, Bosque  
Tucumano-Boliviano, 0–2500 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, PA, SC, TA.

Muestra: *L. Naessany 64* (BOLV, DAV,  
LPB, M, USM).

Nota: Material de PA parece *C.*  
*brasiliensis* en hojas e indumento,  
pero tiene espinas curvadas y son  
trepadoras, es incluido aquí.

Nom. Vern.: Chichapí, chichipí, jis-si  
tao, satasche, satajchi, satajchi de  
monte, uña de gato, yahuatáo.

**Celtis schippii Standl.**, Publ. Field  
Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 12: 409.  
1936.

Sin.: *Sparrea schippii* (Standl.) Hunz.  
& Dottori

Ref.: Hunziker & Dottori (1978),  
Parker & Bailey (1991), López  
Calderón (1993d), Killeen &  
Schulenberg (1998), Alverson et al.  
(2000), Arrázola Rivero et al. (2000),  
Montambault (2002), Nee (2004).

Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque  
Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Muestra: *R.B. Foster et al. 12526*  
(BOLV, LPB).

Nom. Vern.: Ajipa, bidu qui, farinha  
seca, noves, ojoso blanco, ojoso  
negro, palo chonta, palo de ají, rucní.

**Lozanella Greenm.**, Proc. Amer. Acad. Arts 41(9): 236. 1905.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Lozanella enantiophylla (Donn. Sm.) Killip & C.V. Morton**, J. Wash. Acad. Sci. 21(14): 339. 1931.  
Sin.: *Trema enantiophylla* Donn. Sm.  
Ref.: Baehni (1937), López Calderón (1993d), Navarro Sánchez & Ferreira (2000), Nee (2004).  
Arbolito. Nativa. Andes. Yungas, 1500–3500 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 13846* (B, BG, BOLV, DAV, GOET, LPB, M, NY, US, USZ).

**Trema Lour.**, Fl. Cochinch. 2: 539, 562–563. 1790.  
2 especies, 0 especies endémicas.

[**Trema affinis (Planch.) Blume**], Mus. Bot. 2: 58. 1852.  
Sin.: *Sponia affinis* Planch.  
Ref.: Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Trema integerrima (Beurl.) Standl.**, Contr. Arnold Arbor. 5: 55. 1933.  
Sin.: *Sponia integerrima* Beurl.  
Ref.: Miller & Berry (2005).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, CO, LP.  
Muestra: *D.N. Smith et al. 12902* (BOLV, LPB, MO).  
Nom. Vern.: Chumiri.

**Trema micrantha (L.) Blume**, Mus. Bot. 2: 58. 1856.  
Sin.: *Rhamnus micrantha* L.  
Ref.: Foster (1958), Moraes R. (1990), Parker & Bailey (1991), López Calderón (1993d), Killeen & Schulenberg (1998), González et al. (1999), Alverson et al. (2000), Arrázola Rivero et al. (2000), Serrano & Terán (1998 [2000]), Jardim et al. (2003), Nee (2004), Miller & Berry (2005).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, Valles Secos, 0–2500 m.  
Dept.: BE, CH, CO, LP, PA, SC, TA.  
Muestra: *S.G. Beck 7160* (GB, LPB, M, USZ).  
Nom. Vern.: Atadijo, bejuquillo, chimiri, chumiri, chumvea, dotoj, dutu, icharama, merabí, paichane, polimora, uvilla.

**CANNACEAE Juss.**, Gen. Pl. 62. 1789.

Por N. Paniagua (LPB); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).  
1 género, 6 especies, 0 especies endémicas.

**Canna L.**, Sp. Pl. 1: 1. 1753.  
6 especies, 0 especies endémicas.

**Canna bangii Kraenzl.**, Pflanzenr. IV. 47(Heft 56): 38. 1912.  
Ref.: Foster (1958), Tanaka (2001), Maas van de Kamer & Maas (2008), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–3000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *M. Bang 2413* (HT: B destr.; LT: BM; ILT: F, G, GH, K, LE, M, MO-2098328, NY, NY, NY, US, US, WU), *M.A. Lewis 37348* (LPB, MO).  
Nom. Vern.: Achira.

**Canna glauca L.**, Sp. Pl. 1: 1. 1753.  
Sin.: *Canna angustifolia* L., *Canna pruinosa* Hoffmanns., *Canna pedicellata* C. Presl, *Canna lanceolata* Lodd. ex Loudon, *Canna liturata* Link ex A. Dietr., *Canna mexicana* Bouché, *Canna stolonifera* Bouché, *Canna stricta* Bouché, *Canna longifolia* Bouché, *Canna siamensis* Kraenzl., *Canna hassleriana* Kraenzl.  
Ref.: Foster (1958), Killeen & Schulenberg (1998).  
Hierba. Nativa, cultivada. Zonas Bajas. Bosque Seco Chaqueño, Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.  
Dept.: BE, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 5913* (LPB, U).  
Nom. Vern.: Patujú de bajo, patujú de pampa, tarope.

**Canna indica L.**, Sp. Pl. 1: 1. 1753.  
Sin.: *Canna coccinea* Mill., *Canna chinensis* Willd., *Canna textoria* Noronha, *Canna lambertii* Lindl. ex Ker Gawl., *Canna speciosa* Roscoe ex Sims, *Canna edulis* Ker Gawl., *Canna occidentalis* Roscoe ex Ker Gawl., *Canna lanuginosa* Roscoe, *Canna sylvestris* Roscoe, *Canna maxima* Lodd. ex Roscoe, *Canna nepalensis* D. Dietr., *Canna heliconiifolia* Bouché, *Canna xalapensis* Bouché, *Canna cinnabarina* Bouché, *Canna exigua* Bouché, *Canna aurantiaca* Tineo ex Tod., *Canna pulchra* Bouché ex Horan., *Canna generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey  
Ref.: Foster (1958), Schulenberg &

Awbrey (1997), Killeen & Schulenberg (1998), Serrano & Terán (1998 [2000]), Maas van de Kamer & Maas (2008).  
Hierba. Nativa, cultivada. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Seco Chaqueño, Sabanas Benianas del Norte, Sabanas Benianas del Sur, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–2000 m.  
Dept.: BE, CH, LP, SC, TA.  
Muestra: *S.G. Beck 27672* (LPB).  
Nom. Vern.: Achira, chuij, javujna, ori, patuju, yorirr.

**Canna jaegeriana Urb.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15(418–421): 102. 1917.  
Sin.: *Canna leucocarpa* Bouché, *Canna pertusa* Urb., *Canna domingensis* Urb.  
Hierba. Nativa, cultivada. Andes. Yungas, 1500–2500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 18748* (LPB, MO).

**Canna liliiflora Warsz. ex Planch.**, Fl. Serres Jard. Eur. 10: 211, t. 1055–1056. 1854–1855 [1855].  
Sin.: *Canna brittonii* Rusby  
Ref.: Foster (1958), Tanaka (2001), Maas van de Kamer & Maas (2008).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–3000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 13129* (LPB, MO).

**Canna paniculata Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 1, t. 1, f. a. 1798.  
Sin.: *Canna denudata* Roscoe, *Canna brasiliensis* Roscoe ex Spreng., *Canna achiras* Gillies ex D. Don, *Canna jacquini* Bouché, *Distemon jacquini* (Bouché) Bouché, *Distemon linkii* (Bouché) Bouché, *Distemon ottonis* Bouché, *Distemon roscoeanum* Bouché, *Canna kunzei* (Bouché) Kraenzl., *Canna meridensis* Kraenzl., *Canna amambayensis* Kraenzl., *Canna confusa* J.W. Richardson & L.B. Sm.  
Ref.: Tanaka (2001), Maas van de Kamer & Maas (2008).  
Hierba. Nativa, cultivada. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Sabanas Benianas del Norte, Yungas, 0–2000 m.  
Dept.: BE, LP, SC.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 2847* (BOLV, LPB, MA, MO, U, USZ).  
Nom. Vern.: Nubui.

**CAPPARACEAE Juss.**, Gen. Pl. 242. 1789.

Por X. Cornejo (GUAY) y H.H. Iltis (WIS); revisado por S.G. Beck (LPB),