

et al. (2009), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]). Hierba. Nativa. Altiplano. Puna Seca, 3500–5000 m.  
Dept.: PO.  
Muestra: *P.M. Peterson et al. 13008* (GENT, LPB, US).  
Nota: *Scirpus atacamensis* fue reportado por Foster (1958) basado en material de *Oreobolopsis tepalifera*.

**Zameioscirpus muticus Dhooge & Goetgh.**, Pl. Syst. Evol. 246: 133. 2004.

Ref.: Goetghebeur & Simpson (1991), Dhooge et al. (2003), Dhooge (2005), Beck et al. (2010).  
Hierba. Nativa. Altiplano. Puna Húmeda, Puna Seca, 3500–5000 m.  
Dept.: LP, OR, PO.  
Muestra: *X. Menhofer 2000* (LPB, M, NY, SI).

**DIALYPETALANTHACEAE Rizzini & Occhioni**, Lilloa 17: 253. 1948.

Nota: Parte de Rubiaceae (APG III 2009).

**DICHAPETALACEAE Baill.**, Fl. Bras. 12(1): 365. 1886.

Por G.T. Prance (RNG) y E. Chávez (USZ); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).  
2 géneros, 5 especies, 0 especies endémicas.

**Dichapetalum Thouars**, Gen. Nov. Madagasc. 23. 1806.  
3 especies, 0 especies endémicas.

**Dichapetalum latifolium Baill.**, Fl.

Bras. 12(1): 370. 1886.  
Sin.: *Dichapetalum vestitum* var. *cinerascens* Baill., *Dichapetalum amazonicum* K. Krause, *Dichapetalum scandens* var. *cinerascens* (Baill.) J.F. Macbr.  
Ref.: Prance (1972b).  
Liana, subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *O. Buchtien 1718* (NY).

**Dichapetalum rugosum (Vahl) Prance**, Acta Bot. Venez. 3(1–4): 303–304. 1968.

Sin.: *Symphyllanthus rugosus* Vahl  
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).  
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: LP.

Muestra: *M.J. Macía et al. 6012* (LPB, MA).

**Dichapetalum spruceanum Baill.**,

Fl. Bras. 12(1): 371. 1886.  
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).  
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *N.Y. Paniagua et al. 4156* (LPB, MA, MO).

**Tapura Aubl.**, Hist. Pl. Guiane 1:

126, t. 48. 1775.  
2 especies, 0 especies endémicas.

**[Tapura acreana (Ule) Rizzini]**,

Revista Brasil. Biol. 12: 107. 1952.  
Sin.: *Gonypetalum acreanum* Ule  
Ref.: Ruiz de Centurión (1993c).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *T. juruana*.

**Tapura amazonica Poepp.**, Nov.

Gen. Sp. Pl. 3: 41, pl. 246. 1842.  
Sin.: *Tapura ciliata* Gardner, *Tapura amazonica* var. *ciliata* (Gardner) Baill., *Tapura amazonica* var. *cuspidata* Baill., *Tapura amazonica* var. *dasyphylla* Baill., *Tapura amazonica* var. *sublanceolata* Baill.  
Ref.: Prance (1972b), Ruiz de Centurión (1993c), Killeen & Schulenberg (1998), Prance (2001b).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Campos Cerrados, 0–1000 m.  
Dept.: BE, PA, SC.  
Muestra: *R. Guillén V. & V. Choré 1755* (MO, USZ).

**Tapura juruana (Ule) Rizzini**, Revista

Brasil. Biol. 12(1): 106. 1952.  
Sin.: *Gonypetalum juruanum* Ule  
Ref.: Prance (1972b), Parker & Bailey (1991), Ruiz de Centurión (1993c), Alverson et al. (2000), Prance (2001b).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Campos Amazónicos, 0–500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *A.H. Gentry & S. Estenssoro C. 70505* (LPB, MO).  
Nom. Vern.: Abujaja.

**[Tapura tessmannii (K. Krause)**

**Prance]**, Fl. Neotrop. 10: 68. 1972.  
Sin.: *Gonypetalum tessmannii* K. Krause  
Ref.: Ruiz de Centurión (1993c).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *T. juruana*.

**DILLENIACEAE Salisb.**, Parad.

Lond. sub t. 73. 1806.

Por G. Aymard (PORT); revisado por S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
5 géneros, 21 especies, 0 especie endémica.

**Curatella Loeffl.**, Iter Hispan. 229, 260. 1758.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Curatella americana L.**, Syst. Nat. (ed. 10) 2: 1079. 1759.

Ref.: Kubitzki (1971), Parker & Bailey (1991), Todzia & Barrie (1991), Vargas Ramírez (1993a), Aymard C. & Miller (1994), Aymard C. (1998), Killeen & Schulenberg (1998), Nee (2008).  
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, Sabanas Benianas del Norte, Sabanas Benianas del Sur, 0–1000 m.  
Dept.: BE, SC.  
Muestra: *M. Nee 34595* (MO, NY).  
Nom. Vern.: Chaaco.

**Davilla Vand.**, Fl. Lusit. Bras.

Spec. 35, f. 14. 1788.  
5 especies, 0 especies endémicas.

**Davilla elliptica A. St.-Hil.**, Fl. Bras.

Merid. (quarto ed.) 1: 17. 1825.  
Ref.: Kubitzki (1971), Killeen & Schulenberg (1998).  
Liana, arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, Sabanas Benianas del Norte, 0–500 m.  
Dept.: BE, SC.  
Muestra: *J.C. Solomon 6224* (MO, NY).  
Nom. Vern.: Chasueamanca, tutuma.

**Davilla grandiflora A. St.-Hil. &**

**Tul.**, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 17: 131. 1842.

Sin.: *Davilla microcalyx* Herzog  
Ref.: Foster (1958), Kubitzki (1971), Killeen & Schulenberg (1998).  
Trepadora, arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, 0–500 m.  
Dept.: SC.  
Muestra: *T. Killeen et al. 5591* (MO, NY, USZ).

**Davilla kunthii A. St.-Hil.**, Pl.

Usuel. Bras. sub t. 22. 1824.  
Sin.: *Davilla rugosa* var. *capitata* Rusby  
Ref.: Kubitzki (1971), Moraes R. (1990), Aymard C. & Miller (1994), Aymard C. (1998), Killeen & Schulenberg (1998), Nee (2008).  
Trepadora, liana, arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Campos