

Ref.: Tryon & Stolze (1989b), Kessler et al. (2000b), Sundue (2011).
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1000–2000 m.
Dept.: LP, SC.
Muestra: *M. Kessler et al. 9972* (LPB, UC).

DICKSONIACEAE M.R. Schomb.,

Reis. Br.-Guiana 3: 1047. 1848.

Por M. Kessler (Z); revisado por R.C. Moran (NY), S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).

2 géneros, 2 especies, 0 especies endémicas.

Dicksonia L'Hér., Sert. Angl. 30. 1788 [1789].

1 especies, 0 especies endémicas.

Dicksonia sellowiana Hook., Sp.

Fil. 1: 67. 1844.

Sin.: *Balantium karstenianum* Klotzsch, *Dicksonia karsteniana* (Klotzsch) T. Moore, *Dicksonia gigantea* H. Karst., *Dicksonia spruceana* Kuhn, *Dicksonia ghiesbreghtii* Maxon

Ref.: Tryon & Stolze (1989a), García Estigarribia (1993c), Kessler et al. (1999a), Kessler et al. (2000b), Lehnert (2006), Arroyo Padilla et al. (2009), Sundue (2011).

Árbol. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1500–3000 m.

Dept.: CO, LP, SC.
Muestra: *M. Kessler et al. 7085* (LPB, UC).

Lophosoria C. Presl,

Gefässbündel Farn 36. 1847.

1 especie, 0 especies endémicas.

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr., Nat. Hist. Juan Fernandez 2: 16. 1920.

Sin.: *Polypodium glaucum* Sw., *Polypodium quadripinnatum* J.F. Gmel., *Polypodium pruinatum* Sw., *Alsophila pruinata* (Sw.) Kaulf. ex Kunze, *Lophosoria polypodioides* C. Presl, *Lophosoria discolor* C. Presl ex E. Fourn., *Lophosoria pruinata* C. Presl, *Trichosorus densus* Liebm., *Trichosorus frigidus* Liebm., *Trichosorus glaucescens* Liebm., *Trichosorus glaucescens* var. *major* Liebm., *Lophosoria densa* Klotzsch, *Lophosoria frigida* Klotzsch, *Lophosoria glaucescens* Klotzsch, *Alsophila schaffneriana* Fée, *Lophosoria acaulis* Fée, *Lophosoria prostrata* Fée, *Lophosoria*

schaffneriana (Fée) E. Fourn., *Lophosoria warscewiczii* Klotzsch ex E. Fourn., *Lophosoria glauca* Kuhn, *Alsophila glauca* (Sw.) Hieron., *Alsophila quadripinnata* (J.F. Gmel.) C. Chr., *Alsophila pruinata* var. *tenuis* Christ, *Alsophila bilineata* Sodiro, *Cyathea quadripinnata* (J.F. Gmel.) Domin, *Cyathea schaffneriana* (Fée) Domin

Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1989a), García Estigarribia (1993c), Kessler et al. (1999a), Kessler et al. (2000b), Smith et al. (2006), Sundue (2011).

Árbol. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 500–3500 m.

Dept.: CH, CO, LP, SC.
Muestra: *D.N. Smith et al. 13148* (LPB, MO).

DRYOPTERIDACEAE Herter,

Revista Sudamer. Bot. 9: 15. 1949.

Por M. Kessler (Z); revisado por I. Jiménez (LPB), R.C. Moran (NY), P.M. Jørgensen (MO).

15 géneros, 208 especies, 45 especies endémicas.

Arachniodes Blume, Enum. Pl.

Javæ 2: 241–242. 1828.

2 especies, 0 especies endémicas.

Arachniodes denticulata (Sw.)

Ching, Acta Bot. Sin. 10(3): 260. 1962.

Sin.: *Polypodium denticulatum* Sw., *Aspidium denticulatum* (Sw.) Sw., *Polystichum denticulatum* (Sw.) J. Sm., *Nephrodium denticulatum* (Sw.) Fée, *Lastrea denticulata* (Sw.) T. Moore, *Dryopteris denticulata* (Sw.) Kuntze, *Dryopteris denticulata* fo. *boliviensis* C. Chr., *Rumohra denticulata* (Sw.) Copel., *Byrsopteris denticulata* (Sw.) C.V. Morton

Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1991), Kessler et al. (1999a), Kessler et al. (2000b), Sundue (2011).

Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 2000–3500 m.

Dept.: CO, LP, SC.
Muestra: *D.N. Smith et al. 13153* (LPB, MO).

Arachniodes ochropteroides

(Baker) Lellinger, Amer. Fern J. 77(3): 101. 1987.

Sin.: *Nephrodium ochropteroides* Baker, *Dryopteris ochropteroides* (Baker) C. Chr., *Thelypteris ochropteroides* (Baker) Proctor, *Polystichopsis ochropteroides* (Baker) C.V. Morton

Ref.: Smith et al. (1999).

Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2500 m.

Dept.: CO, LP.

Muestra: *M. Kessler 10116* (LPB, UC).

Bolbitis Schott, Gen. Fil. pl. 14. 1834.

3 especies, 0 especies endémicas.

Bolbitis aliena (Sw.) Alston, Bull. Misc. Inform. Kew 1932(7): 310. 1932.

Sin.: *Acrostichum alienum* Sw., *Gymnopteris aliena* (Sw.) C. Presl,

Anapausia aliena (Sw.) C. Presl,

Leptochilus alienus (Sw.) C. Chr.

Ref.: Hennipman (1977), Tryon & Stolze (1991).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: CO, LP, PA.

Muestra: *I. Jiménez 1960* (LPB, UC).

Bolbitis pandurifolia (Hook.) C. Chr.

Index Filic., Suppl. 3, 49. 1934.

Sin.: *Gymnopteris pandurifolia* Hook.

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.

Dept.: LP.

Muestra: *I. Jiménez 2581* (LPB, UC).

Bolbitis serratifolia (Mert. ex Kaulf.) Schott, Gen. Fil. t. 13. 1834 [1835].

Sin.: *Acrostichum serratifolium* Mert. ex Kaulf., *Poecilopteris crenata* C. Presl, *Leptochilus serratus* (Kuhn) C. Chr., *Leptochilus crenatus* (C. Presl) C. Chr., *Bolbitis crenata* (C. Presl) C. Chr.

Ref.: Foster (1958), Hennipman (1977), Tryon & Stolze (1991), Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Kessler et al. (1999a), Kessler et al. (2000b), Serrano & Terán (1998 [2000]), Sundue (2011).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Andes.

Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–1500 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, SC, TA.

Muestra: *P. Weigelt 90316* (GOET, LPB, TUR).

Ctenitis (C. Chr.) C. Chr., Man. Pteridol. 544. 1938.

7 especies, 0 especies endémicas.

Ctenitis ampla (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching, Sunyatsenia 5(4): 240. 1940.

Sin.: *Polypodium amplum* Humb.

& Bonpl. ex Willd., *Aspidium catocarpum* Kunze, *Aspidium nemophilum* Kunze, *Nephrodium*