

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Campos Cerrados, 0–500 m. Dept.: SC. Muestra: *N.P. Ritter & G.E. Crow 2225* (BOLV, LPB, MO, NHA).

**Utricularia triloba Benj.**, Fl. Bras. 10: 248. 1847. Ref.: Taylor (1989), Ritter & Crow (2000). Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m. Dept.: BE. Muestra: *W.R. Anderson 11999* (NY).

**Utricularia unifolia Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 20, t. 31B. 1797 [1798]. Ref.: Foster (1958), Taylor (1989), Ritter & Crow (2000). Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3500 m. Dept.: CO, LP. Muestra: *J.C. Solomon & B.A. Stein 11678* (LPB, MO).

**Utricularia warmingii Kamienski**, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 12: 7. 1894. Sin.: *Utricularia hoehnii* Kuhlm. Ref.: Beck (1984), Taylor (1989), Ritter & Crow (2000). Acuática. Nativa. Zonas Bajas. Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m. Dept.: BE. Muestra: *S.G. Beck 3276* (K, LPB).

## LILIACEAE Juss., Gen. Pl. 48. 1789.

Nota: Véase Alstroemeriaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae e Hypoxidaceae.

## LIMNOCHARITACEAE Takht. ex Cronquist, Integr. Syst. Class. 1048. 1981.

Nota: Parte de Alismataceae (APG III 2009).

## LINACEAE DC. ex Perleb, Vers. Arzneikr. Pfl. 107. 1818.

Por N. Salinas (CUZ) [*Cliococca*, *Linum*], A. Jardim (USZ) [*Hebepetalum*, *Roucheria*]; revisado por S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO). 4 géneros, 10 especies, 0 especies endémicas.

**Cliococca Bab.**, Proc. Linn. Soc. Lond. 1: 90. 1841. 1 especie, 0 especies endémicas.

**Cliococca selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner**, Rhodora 73(796): 563. 1971. Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Semideciduo Chiquitano, 500–1000 m. Dept.: SC. Muestra: *A. Molina 342* (MO, NY, USZ).

**Hebepetalum Benth.**, Gen. Pl. 1: 244. 1862. 1 especie, 0 especies endémicas.

**Hebepetalum humiriifolium (Planch.) Benth.**, Gen. Pl. 1: 242. 1862. Sin.: *Roucheria humiriifolia* Planch., *Roucheria angulata* Gleason Ref.: Macbride (1949b), Spichiger et al. (1990), Jardim & Berry (1999). Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Campos Amazónicos, 0–500 m. Dept.: BE, LP, PA. Muestra: *A. Perry 1119* (LPB, MO).

**Linum L.**, Sp. Pl. 1: 277–281. 1753. 5 especies, 0 especies endémicas.

**Linum filiforme Urb.**, Linnaea 41: 643. 1877. Ref.: Foster (1958), Schulenberg & Awbrey (1997), Serrano & Terán (1998 [2000]). Hierba. Nativa. Andes. Bosque Serrano Chaqueño, 2000–2500 m. Dept.: CH, TA. Muestra: *K. Fiebrig 2573* (GH).

**Linum junceum A. St.-Hil.**, Fl. Bras. Merid. (quarto ed.) 1: 134, t. 24. 1824. Ref.: Macbride (1949b). Hierba. Nativa. Andes. Valles Secos, 2000–3000 m. Dept.: CO, TA. Muestra: *S.G. Beck 26197* (LPB). Nota: Identificación tentativa.

**Linum prostratum Dombey ex Lam.**, Encycl. 3: 525. 1791. Ref.: Garcke (1877), Macbride (1949b), Rogers & Mildner (1976). Hierba. Naturalizada. Andes. Valles Secos, 2500–3000 m. Dept.: LP. Muestra: *N. Salinas 3399* (CUZ, LPB).

**Linum scoparium Griseb.**, Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19: 103. 1874. Ref.: Macbride (1949b), Foster (1958),

Rogers & Mildner (1976). Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Valles Secos, 1500–2500 m. Dept.: CO, LP, TA. Muestra: *M. Kessler & M. Kelschbach 66* (GOET, LPB). Nota: La identificación del material de TA es tentativa.

**Linum usitatissimum L.**, Sp. Pl. 1: 277. 1753. Ref.: Macbride (1949b), Rogers & Mildner (1976). Hierba. Cultivada. Andes. Yungas, Valles Secos, 2000–3500 m. Dept.: CO, LP. Muestra: *E. García 781A* (LPB).

**Roucheria Planch.**, London J. Bot. 6: 141. 1847. 3 especies, 0 especies endémicas.

**Roucheria columbiana Hallier f.**, Beih. Bot. Centralbl. 39(2): 49. 1923. Sin.: *Roucheria punctata* (Ducke) Ducke Ref.: Spichiger et al. (1990), Jardim & Berry (1999). Arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m. Dept.: PA. Muestra: *A. Jardim 667* (MO, USZ).

**Roucheria laxiflora H. Winkl.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 109. 1909. Ref.: Foster (1958), Gutiérrez Crespo (1993c), Jardim & Berry (1999). Arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2000 m. Dept.: LP. Tipo y muestra: *O. Buchtien 2106* (ST: GH, NY, US), *A.H. Gentry & J.C. Solomon 44402* (LPB, MO).

**Roucheria schomburgkii Planch.**, London J. Bot. 7: 526. 1848. Sin.: *Hebepetalum schomburgkii* (Planch.) Ducke Ref.: Jardim & Berry (1999). Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m. Dept.: BE, PA. Muestra: *A. Jardim 2447* (MO, USZ).

## LINDERNIACEAE Borsch, K. Müll. bis & Eb. Fisch., Pl. Biol. (Stuttgart) 7(1): 76. 2005.

Por: M.d.I.M. Sosa (CTES) y S.G. Beck (LPB); revisado por T. Borsch (B), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO). 4 géneros, 6 especies, 0 especies endémicas.