

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.  
Dept.: BE, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 3243* (F, LPB).

**Pilularia L.**, Sp. Pl. 2: 1100. 1753.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Pilularia americana A. Braun**, Monatsber. Konigl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1863: 435. 1863.  
Sin.: *Pilularia mandonii* A. Br.  
Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1994).  
Hierba. Nativa. Altiplano. Puna Húmeda, 4000–4500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *N.P. Ritter 1341* (LPB).

**METAXYACEAE Pic. Serm.**,  
Webbia 24(2): 701–702. 1970.  
Por M. Kessler (Z); revisado por R.C. Moran (NY), S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

**Metaxya C. Presl**, Tent. Pterid. 59. 1836.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Metaxya rostrata (Kunth) C. Presl**, Tent. Pterid. 60, t. 1, f. 5. 1836.  
Sin.: *Aspidium rostratum* Kunth, *Alsophila rostrata* (Kunth) Mart.  
Ref.: Foster (1958), Stolze (1976), Tryon (1976), Tryon & Stolze (1989a), Parker & Bailey (1991), García Estigarribia (1993g), Killeen & Schulenberg (1998).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Muestra: *L. Arroyo P. et al. 713* (MO, UC, USZ).

**OLEANDRACEAE Ching ex Pic. Serm.**, Webbia 20(2): 745. 1965.  
Por M. Kessler (Z); revisado por I. Jiménez (LPB), R.C. Moran (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
1 género, 3 especies, 0 especies endémicas.

**Oleandra Cav.**, Anales Hist. Nat. 1(2): 115. 1799.  
3 especies, 0 especies endémicas.

**Oleandra articulata (Sw.) C. Presl**, Tent. Pterid. 78, t. 2, f. 12. 1836.  
Sin.: *Aspidium articulatum* Sw., *Polypodium articulatum* (Sw.) Poir.  
Epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–2000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *M. Kessler 13166* (GOET, LPB, UC).

**Oleandra pilosa Hook.**, Gen. Fil. t. 45B. 1840.  
Epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–2000 m.  
Dept.: BE, CO, LP.  
Muestra: *M. Kessler 9679* (LPB, UC).

**Oleandra zapatana Lellinger**, Proc. Biol. Soc. Wash. 89(61): 719, f. 3. 1977.  
Epífita. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.  
Dept.: BE, LP.  
Muestra: *A. Fay & L.E. Fay 2761* (LPB, MO).

**OPHIOGLOSSACEAE Martinov**, Tekhno-Bot. Slovar. 438. 1820.  
Por M. Kessler (Z); revisado por R.C. Moran (NY), S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
2 géneros, 7 especies, 0 especies endémicas.

**Botrychium Sw.**, J. Bot. (Schrader) 1800(2): 8, 110. 1800 [1801].  
2 especies, 0 especies endémicas.

**Botrychium schaffneri Underw.**, Bull. Torrey Bot. Club 30: 51. 1903.  
Sin.: *Botrychium pusillum* Underw., *Sceptridium pusillum* (Underw.) Lyon, *Sceptridium schaffneri* (Underw.) Lyon, *Botrychium schaffneri* var. *pusillum* (Underw.) R.T. Clausen  
Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1989b), Sundue (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Páramo Yungueño, 2000–4000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *J.C. Solomon 18316* (LPB, MO).

**Botrychium virginianum (L.) Sw.**, J. Bot. (Schrader) 1800(2): 111. 1800 [1801].  
Sin.: *Osmunda virginiana* L., *Osmunda cicutaria* Savigny, *Botrychium cicutarium* (Savigny) Sw., *Botrychium virginianum*

var. *mexicanum* Hook. & Grev., *Botrychium virginianum* var. *meridionale* Butters  
Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1989b), Kessler et al. (2000b), Triana-Moreno & Murillo Aldana (2005), Sundue (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 2000–3500 m.  
Dept.: CO, LP, SC, TA.  
Muestra: *M.A. Sundue 851* (NY, USZ).

**Ophioglossum L.**, Sp. Pl. 2: 1062–1063. 1753.  
5 especies, 0 especies endémicas.

**Ophioglossum crotalophoroides Walter**, Fl. Carol. 256. 1788.  
Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1989a), Serrano & Terán (1998 [2000]).  
Hierba. Nativa. Andes. Altiplano. Páramo Yungueño, Puna Húmeda, 3500–4500 m.  
Dept.: CH, CO, LP.  
Muestra: *H.U. Pestalozzi 633* (BOLV, LPB).

**[Ophioglossum lusitanicum L.]**, Sp. Pl. 2: 1063. 1753.  
Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1989b).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Ophioglossum nudicaule L. f.**, Suppl. Pl. 443. 1781 [1782].  
Sin.: *Ophioglossum ellipticum* Hook. & Grev., *Ophioglossum tenerum* Mett. ex Prantl, *Ophioglossum nudicaule* var. *tenerum* (Mett. ex Prantl) R.T. Clausen  
Ref.: Foster (1958).  
Hierba. Nativa. Altiplano. Puna Húmeda, 3500–4000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *S.G. Beck 15443* (LPB, UC).

**Ophioglossum palmatum L.**, Sp. Pl. 2: 1063. 1753.  
Sin.: *Cheiroglossa palmata* (L.) C. Presl  
Ref.: Ibsch (1996), González et al. (1999), Kessler et al. (1999a), Sundue (2011).  
Epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–3000 m.  
Dept.: CO, LP, SC, TA.  
Muestra: *D.N. Smith et al. 13386* (LPB, MO).

**Ophioglossum reticulatum L.**, Sp. Pl. 2: 1063. 1753.  
Sin.: *Ophioglossum peruvianum* C. Presl  
Ref.: Foster (1958), Tryon & Stolze (1989a), Arroyo Padilla et al. (2009), Sundue (2011).