

Trichostigma octandrum (L.) H.

Walter, Pflanz. IV. 83 (Heft 39): 109. 1909.

Sin.: *Rivina octandra* L., *Villamillia octandra* (L.) Benth. & Hook. f.

Ref.: Walter (1909), Foster (1958), Nowicke (1968), Parker & Bailey (1991).

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, CO, LP, SC.

Muestra: *E. Werdermann 2648* (B, LPB, MO).

PICRAMNIACEAE Fernando & Quinn, Taxon 44: 177. 1995.

Por J.R. Pirani (SPF) y W.W. Thomas (NY); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

3 géneros, 7 especies, 0 especies endémicas.

Alvaradoa Liebm., Vidensk.

Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1853(3–4): 100–103. 1853 [1854].

1 especie, 0 especies endémicas.

[Alvaradoa amorphoides Liebm.], Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist.

Foren. Kjøbenhavn 1853(3–4): 101–103. 1853 [1854].

Ref.: Foster (1958).

Nota: El registro se basa en material mal identificado de *A. subovata*.

Nativa de Centro América.

Alvaradoa subovata Cronquist,

Brittonia 5(2): 134. 1944.

Sin.: *Alvaradoa amorphoides* var. *puberulenta* Monach.

Ref.: Cronquist (1944), Sleumer (1953), Foster (1958), Arrázola Rivero (1993f), Serrano & Terán (1998 [2000]).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Tucumano-Boliviano, 500–2000 m.

Dept.: CH, SC, TA.

Tipo y muestra: *J. Steinbach 8302* (HT: NY; IT: CAS, F, GH, GH, MO), *M.H. Nee 48939* (LPB, MO, NY).

Infra: *Alvaradoa subovata* var. *subovata*
Nom. Vern.: Whiphay.

Nothotalisia W.W. Thomas,

Brittonia 63(1): 51–54. 2011.

1 especie, 0 especies endémicas.

Nothotalisia peruviana (Standl.)

W.W. Thomas, Brittonia 63(1): 55–58, f. 3. 2011.

Sin.: *Talisia peruviana* Standl.

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE.

Muestra: *J.C. Solomon 12397* (AAU, F, K, LPB, MO, NY, SPF).

Picramnia Sw., Prodr. 2, 27. 1788.

5 especies, 0 especies endémicas.

Picramnia elliptica Kuhl. ex

Pirani & W.W. Thomas, Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, n.s., Bot.

4(2): 273. 1988.

Ref.: Pirani (1990).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: SC.

Muestra: *T. Killeen et al. 6511* (MO, NY, SPF, USZ).

[Picramnia juniniana J.F. Macbr.],

Candollea 5: 374. 1934.

Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

Picramnia latifolia Tul., Ann. Sci.

Nat., Bot., sér. 3, 7: 258–259. 1847.

Sin.: *Picramnia longissima* Tul.,

Picramnia umbrosa Seem.,

Picramnia macrostachys Klotzsch ex

Engl., *Picramnia eosina* J.F. Macbr.

Ref.: Thomas (1988), Moraes R.

(1990), Pirani (1990), Parker & Bailey (1991), Arrázola Rivero (1993f), Killeen & Schulenberg (1998), Arrázola Rivero et al. (2000).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Sabanas Benianas del Sur, 0–1000 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Muestra: *I. Guareco 121* (LPB, MBM, NY, SPF).

Nom. Vern.: I'si, cucharilla, tinto verde.

[Picramnia magnifolia J.F.

Macbr.], Candollea 5: 376. 1934.

Ref.: Foster (1958), Arrázola Rivero (1993f).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

Picramnia ramiflora Planch.,

London J. Bot. 5: 578. 1846.

Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: LP.

Muestra: *R. Seidel 2493* (BOLV, CTES, LPB, M, MO, NY, SPF, USZ).

Picramnia sellowii Planch., London

J. Bot. 5: 578. 1846.

Sin.: *Picramnia sellowii* subsp.

sellowii, *Picramnia pendula*

Tul., *Picramnia pendula* Herzog,

Picramnia monniifolia Rusby

Ref.: Sleumer (1953), Foster (1958),

Pirani (1990), Arrázola Rivero (1993f),

Killeen & Schulenberg (1998),

Serrano & Terán (1998 [2000]).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–2500 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, SC.

Muestra: *B. Mostacedo & R.B. Foster 30* (F, LPB, NY, SCZ, SPF, USZ).

Nom. Vern.: Café de monte, cafetillo, idiria, it si.

[Picramnia sphaerocarpa Planch.],

London J. Bot. 5: 578. 1846.

Sin.: *Picramnia corallodendron* Tul.

Ref.: Foster (1958), Arrázola Rivero (1993f).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

Picramnia spruceana Engl., Fl.

Bras. 12(2): 238. 1874.

Sin.: *Picramnia tenuis* J.F. Macbr.,

Picramnia krukovii A.C. Sm., *Picramnia*

sellowii subsp. *spruceana* (Engl.) Pirani

Ref.: Foster (1958), Moraes R. (1990),

Pirani (1990), Arrázola Rivero (1993f), Arrázola Rivero et al. (2000).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–1500 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA.

Muestra: *G. Quintana et al. 107* (CUVC, LPB, NY, SPF).

Nom. Vern.: Huchuri.

PICRODENDRACEAE Small, J.

New York Bot. Gard. 18(212):

184. 1917.

Por G. Webster† (DAV); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

Parodiodendron Hunz.,

Kurtziana 5: 331. 1969.

1 especie, 0 especies endémicas.

Parodiodendron marginivillosum (Speg.) Hunz., Kurtziana 5: 333.

1969.

Sin.: *Phyllanthus marginivillosus* Speg.

Ref.: Hunziker (1969a), Villamil (1969), Vargas Caballero (1993), Govaerts et al. (2000).
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Bosque Serrano Chaqueño, Valles Secos, 500–2000 m.
Dept.: CH, CO, SC, TA.
Muestra: *A. Krapovickas* & *A. Schinini* 39171 (CTES, LPB).

PIPERACEAE Giseke, Prae. Ord.
Nat. Pl. 123. 1792.

Por R. Callejas (HUA) [*Peperomia*, *Piper*], G. Mathieu (GENT) [*Peperomia*]; revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).
2 géneros, 216 especies, 79 especies endémicas.

Peperomia Ruiz & Pav., Fl.
Peruv. Prodr. 8, pl. 2. 1794.
123 especies, 51 especies endémicas.

Peperomia aceramarcana Trel., Bull.
Torrey Bot. Club 55: 169. 1928.
Sin.: *Peperomia pseudosilvarum* Yunck.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Mathieu & Callejas Posada (2006).
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2000, 2500–3500 m.
Dept.: CO, LP.
Tipo y muestra: *G.H.H. Tate* 713 (HT: NY; IT: ILL, NY), *L.J. Dorr et al.* 6744 (LPB, NY).
Infra: *Peperomia aceramarcana* var. *variifolia* Yunck.

Peperomia aceroana C. DC., Bull.
Torrey Bot. Club 25: 572. 1898.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Navarro Sánchez (2001), Nee (2004).
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1000–3000 m.
Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.
Tipo y muestra: *H.A. Weddell* 3615 (HT: G; IT: MO, P), *J.C. Solomon & M.H. Nee* 18123 (BR, HUA, LPB, MO).

Peperomia acuminata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1: 32, t. 51, f. a. 1798.
Sin.: *Peperomia larecajana* C. DC., *Peperomia larecajana* var. *angustifolia* Yunck.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Mathieu & Callejas Posada (2006).
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3000 m.
Dept.: CO, LP.
Muestra: *R. Seidel et al.* 1047 (LPB, NY).

Peperomia adenocarpa C. DC., Bull.
Torrey Bot. Club 25: 569. 1898.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).
Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 2000–3000 m.
Dept.: CO, LP.
Tipo y muestra: *G. Mandon* 1116 (HT: P; fotos: F), *J.C. Solomon & M.H. Nee* 18082 (HUA, LPB, MO).

Peperomia alata Ruiz & Pav., Fl.
Peruv. 1: 31–32, pl. 48, f. b. 1798.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Schulenberg & Awbrey (1997), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–2500 m.
Dept.: CH, CO, LP, SC.
Muestra: *S.G. Beck et al.* 24407 (BR, LPB).
Infra: *Peperomia alata* var. *angustifolia* C. DC.

[Peperomia angustata Kunth], Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 68. 1815 [1816].
Sin.: *Peperomia victoriana* C. DC.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Ibsch (1996), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. rhexifolia* y *P. cardenasii*.

[Peperomia argyreia (Miq.) E. Morren], Belgique Hort. 17: 2–4, t. 2. 1867.
Sin.: *Peperomia arifolia* var. *argyreia* Miq.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. scutilimba*.

Peperomia arifolia Miq., Syst. Piperac. 1: 72–73. 1843.
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998), González et al. (1999).
Epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–1500, 2000–2500 m.
Dept.: CO, SC, TA.
Muestra: *M. Saldias et al.* 2704 (HUA, MEXU, MO, USZ).

Peperomia armstrongii Villa, Lilloa 33: 87. 1971.
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Bosque Serrano Chaqueño, Valles Secos, 500–2000 m.

Dept.: CH, TA.
Muestra: *J. Gutiérrez R. et al.* 543 (BR, HSB, MO).

[Peperomia balansana C. DC.], Mém. Soc. Phys. Genève 27(2): 313, pl. 10. 1882.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

Peperomia bangii C. DC., Bull. Torrey Bot. Club 19: 49. 1892.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2000 m.
Dept.: CO, LP.
Tipo y muestra: *H.H. Rusby* 330A (HT: P?; IT: NY), *A.F. Fuentes C. et al.* 4922 (BR, HSB, HUA, LPB, MO).

Peperomia barbarana C. DC., Mém. Soc. Phys. Genève 27(2): 314. 1882.
Ref.: Nee (2004).
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.
Dept.: SC.
Muestra: *M.H. Nee* 36039 (LPB, MO, NY).

Peperomia barbaranoides Yunck., Lilloa 27: 173, t. 53. 1955.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).
Hierba. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.
Dept.: BE, LP, SC.
Tipo y muestra: *O. Kuntze s.n.* (HT: NY), *I. Guareco* 411 (HUA, MO).

[Peperomia blanda (Jacq.) Kunth], Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 67. 1815 [1816].
Sin.: *Piper blandum* Jacq., *Micropiper langsdorffii* Miq., *Peperomia pseudodindygulensis* C. DC.
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004).
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. increscens* mayormente.

Peperomia boliviensis C. DC., Prodr. 16(1): 453. 1869.
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3000 m.
Dept.: LP.
Tipo y muestra: *G. Mandon* 1121a (HT: G p.p.; IT: BM p.p., GH, K p.p., P p.p.; fotos: F ex G), *J.C. Solomon & M.H. Nee* 18115 (BR, HUA, LPB, MO).