

Ref.: Hunziker (1969a), Villamil (1969), Vargas Caballero (1993), Govaerts et al. (2000).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Bosque Serrano Chaqueño, Valles Secos, 500–2000 m.  
Dept.: CH, CO, SC, TA.  
Muestra: *A. Krapovickas* & *A. Schinini* 39171 (CTES, LPB).

**PIPERACEAE Giseke**, Prae. Ord.  
Nat. Pl. 123. 1792.

Por R. Callejas (HUA) [*Peperomia*, *Piper*], G. Mathieu (GENT) [*Peperomia*]; revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).  
2 géneros, 216 especies, 79 especies endémicas.

**Peperomia Ruiz & Pav.**, Fl.  
Peruv. Prodr. 8, pl. 2. 1794.  
123 especies, 51 especies endémicas.

**Peperomia aceramarcana Trel.**, Bull.  
Torrey Bot. Club 55: 169. 1928.  
Sin.: *Peperomia pseudosilvarum* Yunck.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2000, 2500–3500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *G.H.H. Tate* 713 (HT: NY; IT: ILL, NY), *L.J. Dorr et al.* 6744 (LPB, NY).  
Infra: *Peperomia aceramarcana* var. *variifolia* Yunck.

**Peperomia aceroana C. DC.**, Bull.  
Torrey Bot. Club 25: 572. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Navarro Sánchez (2001), Nee (2004).  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1000–3000 m.  
Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.  
Tipo y muestra: *H.A. Weddell* 3615 (HT: G; IT: MO, P), *J.C. Solomon & M.H. Nee* 18123 (BR, HUA, LPB, MO).

**Peperomia acuminata Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 32, t. 51, f. a. 1798.  
Sin.: *Peperomia larecajana* C. DC., *Peperomia larecajana* var. *angustifolia* Yunck.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *R. Seidel et al.* 1047 (LPB, NY).

**Peperomia adenocarpa C. DC.**, Bull.  
Torrey Bot. Club 25: 569. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *G. Mandon* 1116 (HT: P; fotos: F), *J.C. Solomon & M.H. Nee* 18082 (HUA, LPB, MO).

**Peperomia alata Ruiz & Pav.**, Fl.  
Peruv. 1: 31–32, pl. 48, f. b. 1798.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Schulenberg & Awbrey (1997), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–2500 m.  
Dept.: CH, CO, LP, SC.  
Muestra: *S.G. Beck et al.* 24407 (BR, LPB).  
Infra: *Peperomia alata* var. *angustifolia* C. DC.

**[Peperomia angustata Kunth]**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 68. 1815 [1816].  
Sin.: *Peperomia victoriana* C. DC.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Ibsch (1996), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. rhexifolia* y *P. cardenasii*.

**[Peperomia argyreia (Miq.) E. Morren]**, Belgique Hort. 17: 2–4, t. 2. 1867.  
Sin.: *Peperomia arifolia* var. *argyreia* Miq.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. scutilimba*.

**Peperomia arifolia Miq.**, Syst. Piperac. 1: 72–73. 1843.  
Ref.: Killen & Schulenberg (1998), González et al. (1999).  
Epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–1500, 2000–2500 m.  
Dept.: CO, SC, TA.  
Muestra: *M. Saldias et al.* 2704 (HUA, MEXU, MO, USZ).

**Peperomia armstrongii Villa**, Lilloa 33: 87. 1971.  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Bosque Serrano Chaqueño, Valles Secos, 500–2000 m.

Dept.: CH, TA.  
Muestra: *J. Gutiérrez R. et al.* 543 (BR, HSB, MO).

**[Peperomia balansana C. DC.]**, Mém. Soc. Phys. Genève 27(2): 313, pl. 10. 1882.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Peperomia bangii C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 19: 49. 1892.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby* 330A (HT: P?; IT: NY), *A.F. Fuentes C. et al.* 4922 (BR, HSB, HUA, LPB, MO).

**Peperomia barbarana C. DC.**, Mém. Soc. Phys. Genève 27(2): 314. 1882.  
Ref.: Nee (2004).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: SC.  
Muestra: *M.H. Nee* 36039 (LPB, MO, NY).

**Peperomia barbaranoides Yunck.**, Lilloa 27: 173, t. 53. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, LP, SC.  
Tipo y muestra: *O. Kuntze s.n.* (HT: NY), *I. Guareco* 411 (HUA, MO).

**[Peperomia blanda (Jacq.) Kunth]**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 67. 1815 [1816].  
Sin.: *Piper blandum* Jacq., *Micropiper langsdorffii* Miq., *Peperomia pseudodindygulensis* C. DC.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. increscens* mayormente.

**Peperomia boliviensis C. DC.**, Prodr. 16(1): 453. 1869.  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *G. Mandon* 1121a (HT: G p.p.; IT: BM p.p., GH, K p.p., P p.p.; fotos: F ex G), *J.C. Solomon & M.H. Nee* 18115 (BR, HUA, LPB, MO).

**Peperomia bopiana Trel.**, Mem. New York Bot. Gard. 7: 227. 1927. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958). Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m. Dept.: LP, SC. Tipo y muestra: *H.H. Rusby 387* (LT: ILL; ILT: NY), *M.H. Nee 41973* (HUA, LPB, NY).

**Peperomia brevispica C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 25: 570. 1898. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004). Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 1500–2000 m. Dept.: CO, LP, SC. Tipo y muestra: *M. Bang 2641* (HT: NY; IT: F, G, GH, MO, NY, US), *T. Krömer & A. Acebey 1519* (LPB).

**Peperomia brittonii C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 19: 254. 1892. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958). Hierba. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2500 m. Dept.: LP. Tipo y muestra: *M. Bang 329* (HT: G; IT: BM, BR, E, F, GH, GH, K, MO-2161443, NY, NY, PH, US, US, W), *A.F. Fuentes C. 11626* (BR, LPB, MO).

**Peperomia buchtienii Yunck.**, Lilloa 27: 241, t. 118. 1955. Sin.: *Peperomia ottoniana* Miq., *Peperomia ottoniana* fo. *boliviensis* C. DC. Ref.: Foster (1958), Ibsch (1996). Epífita. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2500 m. Dept.: CO, LP, SC. Tipo y muestra: *O. Buchtien 3747* (HT: US; IT: US; fotos: US), *T. Krömer & A. Acebey 1197* (HUA, LPB).

**Peperomia canaminana Trel.**, Mem. New York Bot. Gard. 7: 228. 1927. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958). Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–2000 m. Dept.: BE, CO, LP. Tipo y muestra: *O.E. White 282* (ST: ILL, NY), *T. Krömer et al. 111* (LPB).

**Peperomia cardenasii Trel.**, Mem. New York Bot. Gard. 7: 227. 1927. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), López Vargas (1995), Ibsch (1996), Saravia Miranda (1996), Schulenberg & Awbrey (1997), Serrano & Terán (1998 [2000]). Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, 0–1000 m. Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Tipo y muestra: *M. Cárdenas 1174* (HT: ILL; IT: NY), *J.C. Solomon & S. Urcullo 14099* (MO). Nom. Vern.: Orgo cuncunita.

**Peperomia carnifolia Yunck.**, Lilloa 27: 193, t. 70. 1955. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996). Hierba, epífita. Endémica. Andes. Páramo Yungueño, 3000–3500 m. Dept.: CO. Tipo: *J. Steinbach 9587* (HT: GH; IT: GH, ILL, K, NY). Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia cerrateae Pino & G. Mathieu**, Pl. Ecol. Evol. 144(2): 156. 2011. Hierba. Nativa. Altiplano. Puna Húmeda, 3000–4500 m. Dept.: CO, LP, TA. Muestra: *M.A. Lewis 37133* (LPB, MO).

**Peperomia circinnata Link**, Bot. Jahrb. Syst. 1(3): 64. 1820. Sin.: *Piper circinnatum* (Link) Schult., *Piper circulare* Desf. ex C. DC. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Killeen & Schulenberg (1998), Nee (2004). Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–500, 1500–2000 m. Dept.: BE, CH, LP, PA, SC. Muestra: *G.T. Prance 6605* (K, MICH, P, S, U, US).

**Peperomia collinsii Villa**, Lilloa 33: 92. 1971. Hierba. Nativa. Región, tipo de vegetación y elevación desconocidas. Dept.: CH. Muestra: *M. Serrano et al. 6844a* (BR, HSB, MO).

**Peperomia comarapana C. DC.**, Meded. Rijks-Herb. 27: 8. 1915. Ref.: Foster (1958), Nee (2004). Hierba. Endémica. Andes. Valles Secos, 1000–3000 m. Dept.: CH, LP, SC, TA. Tipo y muestra: *T. Herzog 1903* (HT: G; IT: F, G, L, MO, S, Z; fotos: F ex G), *M. Serrano et al. 6081* (BR, HSB, MO).

**Peperomia coricoensis Yunck.**, Lilloa 27: 287, t. 114. 1955. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996). Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2000 m. Dept.: CO, LP, SC.

Tipo y muestra: *O. Buchtien 3743* (HT: US), *T. Killeen et al. 5024* (BR, HUA, MEXU, MO, USZ).

**Peperomia crystallina Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 30. 1798. Sin.: *Peperomia mandonii* C. DC., *Peperomia mandonii* var. *excelsis* C. DC. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Zanotti et al. (2012). Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1500–3000 m. Dept.: LP, SC. Muestra: *M. Bang 1299* (GH, MO).

**Peperomia curruciformis Trel.**, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 35. 1936. Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m. Dept.: CO, LP. Muestra: *T.B. Croat et al. 84401* (MO).

**Peperomia curtipes Trel.**, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 36. 1936. Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1000–2000 m. Dept.: LP. Muestra: *A.F. Fuentes C. et al. 5173* (BR, HUA, LPB, MO).

**Peperomia cyclaminoides A.W. Hill**, Ann. Bot. (Oxford) 21: 149, t. 15, f. 16–17. 1907. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958). Hierba. Endémica. Andes. Valles Secos, 2500–3000 m. Dept.: CH, CO, TA. Tipo y muestra: *K. Fiebrig 2488* (HT: B destr?; IT: G, M, U, US), *M. Serrano & J. Villalobos 5270* (HSB, MO).

**Peperomia cyclophylla Miq.**, Fl. Bras. 4(1): 219. 1853. Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958). Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m. Dept.: BE, LP, PA, SC. Muestra: *S.G. Beck et al. 19131* (HUA, LPB, MO).

**Peperomia delicatula Henschen**, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 3, 8(8): 22. 1873. Ref.: Ibsch (1996). Epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1000, 1500–2000, 2500–3500 m. Dept.: CO, LP, PA. Muestra: *J.C. Solomon 8771* (LPB, MO, NY).

**Peperomia distachyos (L.) A.**

**Dietr.**, Sp. Pl. (ed. 6) 1: 156. 1831.

Sin.: *Piper distachyon* L., *Peperomia elegans* C. DC.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996), Mathieu & Callejas Posada (2006).

Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1000, 2000–2500 m.

Dept.: CO.

Muestra: *O. Buchtien 2342* (US).

**Peperomia divaricata Yunck.**,

Lilloa 27: 203, pl. 81. 1955.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).

Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 1000–1500 m.

Dept.: LP.

Tipo y muestra: *O. Buchtien 3724* (HT: US; IT: GH, HBG, ILL, NY, UPS; fotos: US), *F. Miranda et al. 713* (BR, LPB, MO).

**Peperomia effusa Yunck.**, Lilloa

27: 240, t. 117. 1955.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Serrano Chaqueño, 500–2000 m.

Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.

Tipo y muestra: *O. Buchtien 3732* (HT: US; IT: ILL, MO, NY, UPS), *A.F. Fuentes C. et al. 7071* (BR, LPB, MO).

**Peperomia efimbriata Trel.**, Mem.

New York Bot. Gard. 7: 226. 1927.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).

Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 3000–3500 m.

Dept.: LP.

Tipo: *O.E. White 164* (HT: ILL; IT: B, K, NY).

Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia elongata Kunth**, Nov.

Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 62. 1815 [1816].

Sin.: *Piper elongatum* Poir.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).

Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–1500 m.

Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.

Muestra: *T. Krömer & A. Acebey 1138* (LPB, MO).

Infra: *Peperomia elongata* var. *piliramea* Trel. & Yunck.

**Peperomia emarginella (Sw. ex**

**Wikstr.) C. DC.**, Prodr. 16(1): 437. 1869.

Sin.: *Piper emarginellum* Sw. ex Wikstr.,

*Peperomia emarginella* var. *glabrior* C. DC.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500 m.

Dept.: LP, SC.

Muestra: *G.H.H. Tate 1112* (NY).

**[Peperomia falsa A.W. Hill]**, Ann.

Bot. (Oxford) 21(82): 151, t. 15, f. 10–11. 1907.

Ref.: Adolfo María (1966).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Peperomia galioides Kunth**, Nov.

Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 71, t. 17. 1815 [1816].

Sin.: *Peperomia galiifolia* Trel.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), López Vargas (1995), Ibisch (1996), Saravia Miranda (1996), Navarro Sánchez (2001), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).

Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1000–2000, 2500–4000 m.

Dept.: CH, CO, LP, PO, SC, TA.

Muestra: *F.T. Grifo & J.C. Solomon 663* (AAU, BH, F, HUA, LPB, MO, NY).

Infra: *Peperomia galioides* var. *longifolia* C. DC.

Nom. Vern.: China cuncunita, org'o cuncunita.

**Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr.**,

Sp. Pl. (ed. 6) 1: 156. 1831.

Sin.: *Piper glabellum* Sw., *Piper scandens* Sw.

Ref.: Foster (1958), Ibisch (1996), Killeen & Schulenberg (1998), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).

Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–3500 m.

Dept.: CO, LP, SC.

Muestra: *M.A. Lewis 40380* (AAU, BR, HUA, LPB, MO, NY).

**Peperomia hadrostachya Yunck.**,

Lilloa 27: 273. 1955.

Ref.: Zanotti et al. (2012).

Hierba. Nativa. Andes. Bosque Tucumano-Boliviano, Bosque Serrano Chaqueño, 1000–2000 m.

Dept.: TA.

Muestra: *S.G. Beck & F. Beck 31747* (BR, LPB).

**Peperomia herzogii C. DC.**,

Meded. Rijks-Herb. 27: 9. 1915.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).

Epífita. Endémica. Andes. Yungas, 2000–3500 m.

Dept.: LP.

Tipo y muestra: *T. Herzog 2482* (HT: G; IT: F, L, MO, Z; fotos: F), *J.L. Luteyn & L.J. Dorr 13721* (BR, HUA, LPB, NY).

**Peperomia heterophylla Miq.**,

London J. Bot. 4: 415. 1845.

Sin.: *Peperomia corcovadensis* Gardner, *Peperomia heterophylla* var. *grandis* Yunck.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).

Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 500–2500 m.

Dept.: CO, LP.

Muestra: *J. Steinbach 9309* (GH, NY).

**Peperomia hispidula (Sw.) A.**

**Dietr.**, Sp. Pl. (ed. 6) 1: 165. 1831.

Sin.: *Piper hispidulum* Sw.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Schulenberg & Awbrey (1997), Serrano & Terán (1998 [2000]).

Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 2000–3500 m.

Dept.: CH, LP, SC.

Muestra: *L.J. Dorr et al. 6864* (LPB, NY).

**Peperomia hispiduliformis Trel.**,

Lilloa 6: 295. 1941.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).

Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1500–2500 m.

Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.

Muestra: *J. Steinbach 9132* (GH).

**Peperomia increscens Miq.**,

Linnaea 20: 124. 1847.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Valles Secos, 0–2500 m.

Dept.: CH, SC, TA.

Muestra: *M.H. Nee & J.C. Solomon 36561* (MO, NY).

Nota: La mayoría de muestras identificadas como *P. blanda* de Bolivia son *P. increscens*.

**Peperomia kinnachii Rauch**, Cact.

Succ. J. (Los Angeles) 72(5): 264, f. 7–15. 2000.

Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1500–2000 m.

Dept.: LP.

Tipo: *M.W. Kinnach et al. 2596C* (HT: HNT; IT: HEID).

Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia klotzschiana** Miq., Syst. Piperac. 145. 1843.  
Ref.: Foster (1958), Ibisch (1996).  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 13905* (MO).

**Peperomia kuntzei** C. DC., Revis. Gen. Pl. 3(2): 272. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: CO, SC.  
Tipo y muestra: *O. Kuntze s.n.* (HT: G; IT: NY; fotos: F), *R. Guillén V. et al. 1102* (BR, HUA, LPB, MO, USZ).

**Peperomia lancifolia** Hook., Icon. Pl. 4: t. 332. 1841.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Tucumano-Boliviano, 500–2000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *J.C. Solomon & M.H. Nee 12676* (LPB, MO).

**Peperomia lorentzii** C. DC. ex **Kuntze**, Revis. Gen. Pl. 3(3): 273. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996), González et al. (1999).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 500–1500, 2000–3000 m.  
Dept.: CH, CO, LP, TA.  
Muestra: *J.C. Solomon 10487* (LPB, MO, NY).  
Infra: *Peperomia lorentzii* var. *boliviensis* Yunck.

**Peperomia macrostachyos** (Vahl) A. Dietr., Sp. Pl. (ed. 6) 1: 149. 1831.  
Sin.: *Piper macrostachyon* Vahl, *Peperomia apodostachya* Yunck.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Parker & Bailey (1991), Ibisch (1996), Killeen & Schulenberg (1998), Nee (2004).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, LP, PA, SC.  
Muestra: *T. Krömer & A. Acebey 1448* (HUA, LPB).

**Peperomia maculosa** (L.) Hook., Exot. Fl. 2: t. 92. 1825 [1824].  
Sin.: *Piper maculosum* L.  
Ref.: Ibisch (1996).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1500 m.  
Dept.: CO, LP.

Muestra: *T. Krömer & A. Acebey 1184* (HUA, LPB).

**Peperomia magnifoliiflora** G. Mathieu, Bot. J. Linn. Soc. 157(2): 184–186, f. 5. 2008.  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 2000–2500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *S.G. Beck 3612* (HT: NY; IT: LPB), *L. Symmank et al. 2008-062* (BR, G, GENT, K, LPB, MO).

**[Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr.]**, Sp. Pl. (ed. 6) 1: 153. 1831.  
Sin.: *Piper magnoliifolium* Jacq.  
Ref.: Nee (2004).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. obtusifolia*.

**Peperomia marcapatana** Trel., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 61. 1936.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 2000–2500 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 3196* (HUA, LPB, NY).

**Peperomia martiana** Miq., Syst. Piperac. 1: 189–190. 1843.  
Ref.: Ibisch (1996).  
Epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
Dept.: CO.  
Muestra: *T.B. Croat 51336* (LPB, MO, NY).

**Peperomia mercedana** C. DC., Bot. Jahrb. Syst. 40: 299. 1908.  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 9152* (AAU, LPB, MO, NY, U).

**[Peperomia microphylla Kunth]**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 69, t. 15, f. 2. 1815 [1816].  
Ref.: Ibisch (1996).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. silvarum*.

**Peperomia multifolia** Yunck., Lilloa 27: 227, t. 103. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
Dept.: CO.  
Tipo: *M. Cárdenas 3089* (HT: US).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia multispica** C. DC., Bull. Torrey Bot. Club 25: 571. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2000 m.  
Dept.: LP, SC.  
Tipo y muestra: *M. Bang 2639* (ST: GH, K, MO, NY), *S.G. Beck 25265* (BR, HUA, LPB).

**Peperomia nequejahirana** Trel., Bull. Torrey Bot. Club 55: 169. 1928.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Páramo Yungueño, 2000–3500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *G.H.H. Tate 642* (HT: NY; IT: ILL frag.), *E. Fernández T. et al. 1744* (MO).

**Peperomia nudicaulis** C. DC., Bull. Torrey Bot. Club 19: 48. 1892.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, elevación desconocida.  
Dept.: LP.  
Tipo: *M. Bang 331A* (HT: NY; IT: BM, E, G, GH, ILL, K, M, MICH, MO-2161444, NY, P, US, Z).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia obtusifolia** (L.) A. Dietr., Sp. Pl. (ed. 6) 1: 154. 1831.  
Sin.: *Piper obtusifolium* L.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Muestra: *M.H. Nee & Ez. Chávez 51506* (LPB, MO, NY).

**Peperomia pachydermis** C. DC., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 277–278. 1898.  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Campos Cerrados, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–1500 m.  
Dept.: CH, SC.  
Muestra: *H. Huaylla et al. 2306* (BR, HSB, MO).

**Peperomia parvifolia** C. DC., J. Bot. 4: 133. 1866.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), González et al. (1999), Zanotti et al. (2012).  
Hierba. Nativa. Andes. Páramo Yungueño, Puna Húmeda, Puna Seca, 3500–4500 m.  
Dept.: CH, CO, LP, TA.  
Muestra: *S.G. Beck 30032* (BR, LPB).

**Peperomia parvisagittata G.**

**Mathieu & Pino**, Pl. Ecol. Evol. 144(2): 162. 2011.  
Hierba. Nativa. Andes. Bosque Tucumano-Boliviano, 3000–3500 m.  
Dept.: TA.  
Muestra: *M.S. Samain et al. 2008-083* (BR, GENT, LPB).

**Peperomia pellucida (L.) Kunth**,

Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 64. 1815 [1816].  
Sin.: *Piper pellucidum* L.  
Ref.: Moraes R. (1990), López Vargas (1995), Saravia Miranda (1996), Killeen & Schulenberg (1998), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Seco Chaqueño, 0–500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC, TA.  
Muestra: *L. Sánchez et al. 457* (HUA, LPB, MO, USZ).  
Nom. Vern.: Tabardillo.

**Peperomia peltifolia C. DC.**, Bull.

Torrey Bot. Club 25: 570. 1898.  
Ref.: Foster (1958), Ibsch (1996).  
Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby s.n.* (HT: NY; IT: NY), *J.C. Solomon 10757* (F, K, LPB, MO, NY).

**Peperomia pennellii Trel. &**

**Yunck.**, Piperac. N. South Amer. 2: 608–610, f. 533. 1950.  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 2000–2500 m.  
Dept.: LP, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 25512* (LPB).

**Peperomia pentadactyla Yunck.**,

Lilloa 27: 283, t. 164. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo: *O. Buchtien 637* (HT: ILL; IT: HBG, US).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia perlongipes C. DC.**,

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 308. 1914.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Epífita. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.  
Dept.: CO.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 2344* (HT: GH; IT: US), *S. Altamirano & J.P. Altamirano 2495* (BOLV, MO).

**Peperomia perlongispica Yunck.**,

Lilloa 27: 277, t. 157. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo: *O. Buchtien 3729* (HT: US; IT: GH, ILL, NY).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia peruviana Dahlst.**,

Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n.s. 33(2): 32. 1900.  
Sin.: *Tildenia peruviana* Miq.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Adolfo María (1966), López Vargas (1995), Ibsch (1996), Saravia Miranda (1996), De la Barra (1997).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1000–1500, 3000–4500 m.  
Dept.: CH, CO, LP, PO, TA.  
Muestra: *J.C. Solomon 15818* (MO).  
Infra: *Peperomia peruviana* var. *major* A.W. Hill ex Yunck.

**Peperomia pilicaulis C. DC.**, Annuaire

Conserv. Jard. Bot. Genève 21: 264. 1920.  
Epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–2000 m.  
Dept.: BE, CO, LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 18465* (LPB, MO).

**Peperomia pitiguayana Trel.**, Bull.

Torrey Bot. Club 55: 169. 1928.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1500–2000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo: *G.H.H. Tate 722* (HT: NY; IT: ILL frag., NY).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**[Peperomia procumbens C. DC.]**,

J. Bot. 4: 141. 1866.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Peperomia pseudocobana Yunck.**,

Lilloa 27: 256, t. 133. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996).  
Hierba, epífita. Endémica. Andes. Páramo Yungueño, 2000–2500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *M. Bang s.n.* (HT: NY), *J.C. Solomon 9303* (MO).

**Peperomia pseudofurcata C. DC.**,

Prodr. 16(1): 399. 1869.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–500, 1500–3000 m.

Dept.: CO, LP.

Muestra: *L.J. Dorr 6812* (LPB, NY, US).

**Peperomia pseudopereskiifolia C.**

**DC.**, Prodr. 16(1): 448–449. 1869.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *A.H. Gentry et al. 44276A* (MO).

**Peperomia pseudorhynchophoros**

**C. DC.**, Prodr. 16(1): 425. 1869.  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.  
Dept.: CO.  
Muestra: *S. Altamirano 1395* (BOLV).

**Peperomia pseudorufescens C.**

**DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 21: 160. 1894.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 2000–2500 m.  
Dept.: CO.  
Tipo: *M. Bang 1148a* (HT: NY).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia pseudoubilicata**

**Yunck.**, Lilloa 27: 275, t. 155. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1500–2000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 2448* (HT: NY; IT: G, K, MO, US), *A. Araujo M. et al. 2683* (LPB, MO).

**Peperomia psilophylla C. DC.**, Bull.

Torrey Bot. Club 21: 161. 1894.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, trepadora, epífita. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1500 m.  
Dept.: LP, SC.  
Tipo y muestra: *M. Bang 1516a* (HT: NY; IT: G), *J.C. Solomon & S. Urcullo 14096* (HUA, LPB, MO).

**Peperomia psilostachya C. DC.**,

Mém. Soc. Phys. Genève 32(2): 9, pl. 54, f. 6–9. 1893.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996).  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1500–3000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *G.H.H. Tate 971* (NY).

**Peperomia punctulatissima Trel.**,

Mem. New York Bot. Gard. 7: 228. 1927.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).

Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: LP, SC.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby 592* (HT: ILL; IT: NY), *T. Krömer & A. Acebey 644* (HUA, LPB).

**Peperomia purpureonervosa G. Mathieu**, Pl. Ecol. Evol. 144(2): 168. 2011.  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 2500–3500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *L. Symmank et al. 2008-051* (HT: BR; IT: GENT, LPB, MO), *A.F. Fuentes C. et al. 10409* (BR, LPB, MO).

**Peperomia quadrifolia (L.) Kunth**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 69–70. 1815 [1816].  
Sin.: *Piper quadrifolium* L.  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *T. Krömer 1114* (HUA, LPB).

**Peperomia quaesita Trel.**, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 83. 1936.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Nee (2004).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *J.C. Solomon & S. Urcullo 14097* (LPB, MO).

**Peperomia radiatinervosa G. Mathieu**, Pl. Ecol. Evol. 144(2): 171. 2011.  
Hierba. Endémica. Andes. Bosque Tucumano-Boliviano, 2500–3500 m.  
Dept.: CH, CO.  
Tipo y muestra: *M.S. Samain et al. 2008-090* (HT: BR; IT: G, GENT, K, LPB, MO), *M.S. Samain et al. 2008-127* (BR, GENT, LPB).

**Peperomia reptans C. DC.**, J. Bot. 4: 143. 1866.  
Sin.: *Peperomia duidana* Trel.  
Ref.: Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2500–3000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *M. Cárdenas 1334* (ILL).

**Peperomia retroperubera Yunck.**, Lilloa 27: 184, t. 64. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.

Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 628* (HT: US; IT: ILL, NY frag.), *E. Fernández T. 4323* (BOLV, LPB, MO).

**Peperomia rhexiifolia Moritz ex C. DC.**, Prodr. 16(1): 460. 1869.  
Sin.: *Peperomia semimetralis* C. DC.  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–3000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *L.J. Dorr et al. 6817* (HUA, LPB, NY).

**Peperomia rhombea Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 31, t. 46, f. b. 1798.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Nee (2004).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 500–2000 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Muestra: *O.E. White 404* (GH, ILL, K, NY).

**Peperomia rhombifolia Trel.**, Mem. New York Bot. Gard. 7: 226. 1927.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby 581* (HT: ILL; IT: NY), *O. Buchtien 5381* (NY, US).

**Peperomia rotundata Kunth**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 67, t. 12. 1815 [1816].  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996).  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–3000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *J.P. Schmitt 269* (HUA, LPB).

**Peperomia rotundifolia (L.) Kunth**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 65–66. 1815 [1816].  
Sin.: *Piper rotundifolium* L., *Acrocarpidium nummularifolium* fo. *pilosior* Miq., *Peperomia rotundifolia* var. *pilosior* (Miq.) C. DC.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–3000 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *M.H. Nee 37249* (LPB, MO, NY).

**Peperomia rurrenabaqueana Trel.**, Mem. New York Bot. Gard. 7: 226. 1927.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996).  
Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, LP.  
Tipo: *H.H. Rusby 794* (HT: ILL; IT: GH, K, NY, US).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Peperomia rusbyi C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 19: 49. 1892.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby 2214* (HT: NY), *A.F. Fuentes C. et al. 8017* (BR, CTES, HSB, LPB, MA, MO).

**Peperomia saxicola C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 25: 571. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Valles Secos, 1000–1500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *G. Mandon 1118* (HT: P; fotos: F ex P), *S.G. Beck 2964* (LPB, NY).

**Peperomia scutifolia C. DC.**, Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 6: 497. 1917.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: PA.  
Muestra: *F.J. Fernández Casas & A. Susanna 8488* (LPB, MO, NY).

**Peperomia scutilimba Yunck.**, Lilloa 27: 275, t. 154. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), González et al. (1999), Nee (2004).  
Hierba. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Serrano Chaqueño, 0–1500 m.  
Dept.: CH, LP, SC, TA.  
Tipo y muestra: *M. Cárdenas 1336* (HT: ILL; IT: ILL), *K. Wendelberger 303* (HSB, MO).

**Peperomia serpens (Sw.) Loudon**, Hort. Brit. 13. 1830.  
Sin.: *Piper serpens* Sw.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Parker & Bailey (1991), Ibsch (1996), Nee (2004).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Muestra: *G.H.H. Tate 499* (NY).

- Peperomia silvarum C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 305–306. 1914.  
Ref.: Foster (1958), Ibisch (1996), Schulenberg & Awbrey (1997), Serrano & Terán (1998 [2000]).  
Hierba. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 500–1500, 2500–3500 m.  
Dept.: CH, CO, LP, TA.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 797* (LT: US; ILT: US, W), *M.A. Lewis 38229* (BR, HUA, LPB, MA, MO).  
Muestra: *S.G. Beck 7250* (HUA, LPB, NY).
- Peperomia stuebelii C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 19: 255. 1892.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–500, 1000–3000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *A. Stübel 42* (HT: B; IT: NY), *S.G. Beck 8394* (BR, LPB, MO).  
Infra: *Peperomia stuebelii* var. *glabrata* Yunck.
- Peperomia suspensa C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 304. 1914.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 2000–2500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 2792* (HT: NY; IT: US), *O. Buchtien 8934* (NY).
- Peperomia swartziana Miq.**, Syst. Piperac. 155. 1843.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).  
Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *M.A. Jaramillo et al. 1200* (HUA, MO, USZ).
- Peperomia talinifolia Kunth**, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 1: 62, t. 8. 1815 [1816].  
Sin.: *Peperomia talinifolia* var. *longipetiolata* C. DC.  
Ref.: Yuncker (1953b).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1000–3000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *L. Cayola 1618* (BOLV, BR, LPB, MO, USZ).
- Peperomia tatei Yunck.**, Lilloa 27: 220, t. 95. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Valles Secos, 2000–2500 m.  
Dept.: CH, LP, SC.  
Tipo y muestra: *G.H.H. Tate 643* (HT: NY; IT: ILL, NY), *A.F. Fuentes C. & H. Huaylla 13000* (BR, LPB, MO).
- Peperomia tenuipeduncula C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 306. 1914.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).
- Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1000, 1500–2000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 2338* (HT: GH; IT: G, US), *T. Krömer & A. Acebey 1188* (HUA, LPB).
- Peperomia ternata C. DC.**, Bull. Herb. Boissier 6(7): 509. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1000, 1500–3000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *M. Cárdenas 1332* (ILL, LIL).
- Peperomia tetragona Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 31, t. 47, f. a. 1798.  
Sin.: *Piper tetragonum* (Ruiz & Pav.) Vahl  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996), Nee (2004), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–2000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *H.H. Rusby 2213* (NY).
- Peperomia tetraphylla Hook. & Arn.**, Bot. Beechey Voy. 97. 1841 [1832].  
Sin.: *Piper reflexum* L. f., *Piper tetraphyllum* G. Forst., *Piper pusillum* Blume  
Ref.: Foster (1958), Ibisch (1996), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Páramo Yungueño, Valles Secos, 500–2500 m.  
Dept.: CO, LP, SC, TA.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 2867* (BOLV, CTES, F, K, LPB, MO, USZ).
- Peperomia theodori Trel.**, Lilloa 5: 356. 1940.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996), Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004).  
Hierba, epífita. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Valles Secos, 0–2000 m.  
Dept.: CH, CO, LP, OR, PO, SC, TA.  
Muestra: *R. Ehrlich 241* (HUA, LPB, MO).  
Infra: *Peperomia theodori* var. *glabricaulis* Yunck.
- Peperomia ticunhuayana Trel.**, Bull. Torrey Bot. Club 55: 170. 1928.  
Ref.: Yuncker (1953a), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1000, 1500–3000 m.
- Peperomia sirupayana C. DC.**, Candollea 1: 361. 1923.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, 1500–2000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo: *O. Buchtien s.n.* (HT: US).  
Nota: Conocida solamente del tipo.
- Peperomia soratana C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 25: 569. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Endémica. Andes. Yungas, elevación desconocida.  
Dept.: LP.  
Tipo: *G. Mandon 1115* (HT: P; IT: K; fotos: F ex P).  
Nota: Conocida solamente del tipo.
- Peperomia steinbachii Yunck.**, Lilloa 27: 234, t. 113. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibisch (1996).  
Hierba, epífita. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 500–2000 m.  
Dept.: CO, LP, TA.  
Tipo y muestra: *J. Steinbach 8848* (HT: GH; IT: BM, E, G, K, LIL, MO-976560, NY, S), *M.A. Jaramillo et al. 1153* (HUA, MO, USZ).
- Peperomia stelechophila C. DC.**, Prodr. 16(1): 433. 1869.  
Sin.: *Peperomia chromatogena* Yunck.  
Ref.: Foster (1958), Ibisch (1996), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 5382* (HT: US), *J.C. Solomon 10801* (MO).
- Peperomia striata Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 32, t. 52, f. b. 1798.  
Ref.: Mathieu & Callejas Posada (2006).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–3000 m.  
Dept.: LP, SC.

Dept.: LP.  
 Tipo y muestra: *G.H.H. Tate 1082* (HT: NY; IT: ILL fragm., NY), *J.C. Solomon 17613* (BR, HUA, LPB, MO, NY).

**Peperomia tominana C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 25: 572. 1898.  
 Sin.: *Peperomia fiebrigii* C. DC.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Adolfo María (1966), Ibsch (1996), Serrano & Terán (1998 [2000]), Navarro Sánchez (2001), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
 Hierba, epífita. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Páramo Yungueño, 1000–3000 m.  
 Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.  
 Tipo y muestra: *H.A. Weddell 3109* (HT: P), *J. Villalobos 132* (BR, GH, HSB, MO, NY).

**Peperomia tovariana C. DC.**, Prodr. 16(1): 404. 1869.  
 Epífita. Nativa. Andes. Yungas, 2000–2500 m.  
 Dept.: LP.  
 Muestra: *A.F. Fuentes C. et al. 12251* (BR, LPB, MO).

**Peperomia trianae C. DC.**, J. Bot. 4: 135–136. 1866.  
 Sin.: *Peperomia imbracteata* Yunck.  
 Epífita. Nativa. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
 Dept.: LP.  
 Muestra: *O. Buchtien 3737* (GH, ILL, NY, US).

**Peperomia trinervis Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 32, t. 50, f. b. 1798.  
 Sin.: *Peperomia dumeticola* C. DC.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Ibsch (1996), Nee (2004).  
 Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2500 m.  
 Dept.: BE, CO, LP, SC.  
 Muestra: *M.H. Nee 44402* (LPB, MO, NY).

**[Peperomia umbilicata Ruiz & Pav.]**, Fl. Peruv. 1: 30, t. 45, f. b. 1798.  
 Ref.: Adolfo María (1966).  
 Nota: El registro se basa en material mal identificado. Atribuido a Dahls en Adolfo María (1966).

**Peperomia unduavina C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 306. 1914.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Mathieu & Callejas Posada (2006).  
 Hierba. Endémica. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 2000–3500 m.  
 Dept.: CH, CO, LP, SC.

Tipo y muestra: *O. Buchtien 2790* (HT: US), *J.C. Solomon & M.H. Nee 18083* (BR, HUA, LPB, MO).

**Peperomia vestita C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 25: 568. 1898.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
 Hierba. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500 m.  
 Dept.: CO, LP, SC.  
 Tipo y muestra: *M. Bang 2645* (HT: NY; IT: B, F, G, GH, K, MO-6398, NY, US), *L. Cayola et al. 2086* (BR, LPB, MA, MO).  
 Infra: *Peperomia vestita* var. *lindenii* Rauh

**Peperomia williamsii C. DC.**, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 21: 248. 1920.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
 Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2500, 3500–4000 m.  
 Dept.: CO, LP.  
 Tipo y muestra: *R.S. Williams 2652* (HT: NY), *A.F. Fuentes C. et al. 9000* (LPB, MO).

**Peperomia yanacachiana Yunck.**, Lilloa 27: 228, t. 104. 1955.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
 Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
 Dept.: LP.  
 Tipo y muestra: *O. Buchtien 544* (HT: US; IT: G, W), *J.C. Solomon & M.E. Uehling 12162* (AAU, BR, F, HUA, K, LPB, MICH, MO, NY, SI).

**Peperomia yungasana C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 306. 1914.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
 Hierba, epífita. Endémica. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 2000–3500 m.  
 Dept.: CO, LP.  
 Tipo y muestra: *O. Buchtien 2793* (ST: G, GH, UPS, US), *M.A. Lewis 38053* (BR, HUA, LPB, MO).

**Piper L.**, Sp. Pl. 1: 28. 1753.  
 93 especies, 28 especies endémicas.

**Piper acutifolium Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 38 t. 64. 1798.  
 Sin.: *Piper mandonii* C. DC.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a), Serrano & Terán (1998 [2000]).  
 Arbusto, arbolito, árbol. Cultivada. Andes. Yungas, Bosque Serrano Chaqueño, 2000–3000 m.

Dept.: CH, CO, LP.  
 Muestra: *M. Saldias 643* (HUA, MO, NY).  
 Nom. Vern.: Matico.

**Piper aduncum L.**, Sp. Pl. 1: 29. 1753.  
 Sin.: *Piper angustifolium* Lam., *Piper kuntzei* C. DC., *Piper guanaianum* C. DC., *Piper herzogii* C. DC., *Piper cardenasii* Trel., *Piper aduncum* var. *cordulatum* (C. DC.) Yunck.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a), González et al. (1999), Arrázola Rivero et al. (2000), Nee (2004).  
 Subarbusto, arbusto, arbolito. Nativa, cultivada. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
 Dept.: BE, CO, LP, PA, TA.  
 Muestra: *M.H. Nee 48831* (MO, NY).  
 Infra: *Piper aduncum* var. *garcia-barrigae* Trel. & Yunck.  
 Nom. Vern.: Matico.

**Piper aequale Vahl**, Eclog. Amer. 1: 4, t. 3. 1797.  
 Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).  
 Arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
 Dept.: BE, LP, PA, SC.  
 Muestra: *S.G. Beck 8089* (HUA, LPB, MA, NY).

**Piper alatabaccum Trel. & Yunck.**, Piperac. N. South Amer. 1: 408–409, f. 371. 1950.  
 Ref.: Altamirano Azurduy & Ramos de Sousa (2009).  
 Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
 Dept.: PA.  
 Muestra: *S. Altamirano & H. Ramos 4222* (BOLV, HRA).

**Piper aleyreanum C. DC.**, Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 6: 488. 1917.  
 Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
 Dept.: BE, LP.  
 Muestra: *T. Killeen 8210* (HUA, MO, USZ).  
 Nom. Vern.: Rarama.

**Piper amalago L.**, Sp. Pl. 1: 29. 1753.  
 Sin.: *Piper medium* Jacq., *Piper medium* var. *perglabrum* Yunck.  
 Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Parker & Bailey (1991), Seidel (1993a), Schulenberg & Awbrey (1997), Killeen & Schulenberg (1998), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004).  
 Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas,



- Bosque Tucumano-Boliviano, 0–1000, 1500–2000 m.  
Dept.: BE, CH, LP, SC, TA.  
Muestra: *F. Mamani 574* (HUA, MO, USZ).  
Nom. Vern.: Ambaibillo, paraparoba grande.
- Piper anonifolium** Kunth, *Linnaea* 13: 619. 1839 [1840].  
Sin.: *Steffensia anonifolia* Kunth, *Piper anonifolium* (Kunth) C. DC.  
Subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, PA, SC.  
Muestra: *D.C. Daly et al. 6267* (NY).
- Piper arboreum** Aubl., *Hist. Pl. Guiane* 1: 23. 1775.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Seidel (1993a), Killeen & Schulenberg (1998), Alverson et al. (2000), Jardim et al. (2003).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–2000 m.  
Dept.: BE, LP, PA, SC.  
Muestra: *J.D. Boeke 1472* (NY).  
Nom. Vern.: Ambaibillo.
- [**Piper augustum** Rudge], *Pl. Guian.* 1: 10, pl. 7. 1805.  
Ref.: Parker & Bailey (1991).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.
- Piper bangii** C. DC., *Bull. Torrey Bot. Club* 19: 254. 1892.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a), Nee (2004).  
Subarbusto, arbusto. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–2500 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *M. Bang 380* (HT: G; IT: GH, MO-2160306, NY, NY, US), *M.H. Nee 44403* (LPB, MO).  
Infra: *Piper bangii* var. *pubinervium* Yunck.
- Piper bartlingianum** (Miq.) C. DC., *Prodr.* 16(1): 257. 1869.  
Sin.: *Artanthe bartlingiana* Miq.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Killeen & Schulenberg (1998).  
Subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, SC.  
Muestra: *P.J.M. Maas et al. 8705* (HUA, U).
- Piper bolivianum** C. DC., *Prodr.* 16(1): 280. 1869.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).
- Arbusto, arbolito. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, LP, PA.  
Tipo y muestra: *Kelly & J.B. Pentland s.n.* (HT: LE), *J.C. Solomon & M.H. Nee 12628* (MO, NY).
- Piper callosum** Ruiz & Pav., *Fl. Peruv.* 1: 34, pl. 53. 1798.  
Sin.: *Piper benianum* Trel.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Parker & Bailey (1991), Killeen & Schulenberg (1998), Alverson et al. (2000), Nee (2004).  
Subarbusto, arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 3115* (AAU, BOLV, HUA, LPB, MO, USZ).  
Nom. Vern.: Ambaivilla semirastrera.
- Piper casapiense** (Miq.) C. DC., *Prodr.* 16(1): 367. 1869.  
Sin.: *Artanthe casapiensis* Miq.  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.  
Dept.: BE, LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 7807* (LPB, MO).
- Piper cataractarum** Trel., *Mem. New York Bot. Gard.* 7: 224. 1927.  
Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–1000, 2000–2500 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *D.N. Smith & V. García E. 13815* (HUA, LPB, MO).
- Piper cernuum** Vell., *Fl. Flumin.* 1: 25, t. 58. 1829.  
Ref.: Foster (1958), Seidel (1993a).  
Arbolito. Nativa. Andes. Yungas, 1000–3000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *S.G. Beck 4709* (LPB, NY).
- Piper chavicoide** (Miq.) C. DC., *Prodr.* 16(1): 307. 1869.  
Sin.: *Artanthe chavicoides* Miq.  
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: PA.  
Muestra: *J.C. Solomon 17168* (MO).
- Piper chumboense** Yunck., *Brittonia* 14(2): 189. 1962.  
Subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, PA.  
Muestra: *B.M. Boom 4149* (no localizada).
- Piper cingens** C. DC., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 13: 311. 1914.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Liana, subarbusto. Nativa. Andes. Yungas, 1000–2500 m.  
Dept.: BE, LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 547* (HT: NY; IT: GH), *C. Davidson 4871* (MO).
- Piper conquistanum** Yunck., *Lilloa* 32: 19, f. 3. 1966.  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, PA.  
Tipo y muestra: *E.R. de la Sota 947* (HT: NY), *E.R. de la Sota 886* (ILL).
- Piper consanguineum** Kunth, *Linnaea* 13: 623. 1839 [1840].  
Sin.: *Steffensia consanguinea* (Kunth) Kunth, *Piper consanguineum* (Kunth) Kunth ex C. DC.  
Subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE.  
Muestra: *B.M. Boom 4753* (NY).  
Nom. Vern.: Rarammishni, rurasa.
- Piper coriaceilimbus** C. DC., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 9: 234. 1911.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Liana, subarbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 1333* (IT: US), *J.C. Solomon 10844* (LPB, MO).
- Piper coruscans** Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 1: 53. 1815 [1816].  
Subarbusto, arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–500, 1500–2000 m.  
Dept.: BE, LP, PA.  
Muestra: *M.H. Nee 31730* (LPB, MO).
- Piper costatum** C. DC., *Bot. Jahrb. Syst.* 40: 243. 1908.  
Ref.: Parker & Bailey (1991).  
Arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 1079* (LPB, MO, NY, SRP).
- Piper crassinervium** Kunth, *Nov. Gen. Sp.* (quarto ed.) 1: 48. 1815 [1816].  
Ref.: Parker & Bailey (1991), Seidel (1993a), Killeen & Schulenberg (1998), Alverson et al. (2000), Nee (2004).  
Arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–3000 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *T.B. Croat 51344* (LPB, MO).

**Piper cuspidibracteatum Yunck.**,

Lilloa 27: 107, t. 4, f. 4. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Endémica. Andes. Valles Secos, 1000–2000 m.  
Dept.: BE, SC.  
Tipo: *M. Cárdenas 4040* (HT: F; IT: US).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Piper cuyabanum C. DC.**, Notizbl.

Bot. Gart. Berlin–Dahlem 6: 447. 1917.  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *T.B. Croat 51677* (LPB, MO, NY).

**Piper dasyoura (Miq.) C. DC.**,

Prodr. 16(1): 269. 1869.  
Sin.: *Artanthe dasyoura* Miq.  
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2500–3000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 8389* (AAU, F, GH, HUA, K, LPB, MEXU, MICH, MO, NY, SI, U).

**Piper demeraranum (Miq.) C. DC.**,

Prodr. 16(1): 298. 1869.  
Sin.: *Artanthe demerarana* Miq.  
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, PA, SC.  
Muestra: *P.F. Foster et al. 496* (HUA, MO, USZ).

**Piper dilatatum Rich.**, Actes Soc.

Hist. Nat. Paris 1: 105. 1792.  
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).  
Subarbusto, arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, LP, SC.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 1329* (BOLV, HUA, LPB, MA, MO, USZ).

**Piper divaricatum G. Mey.**, Prim.

Fl. Esseq. 15–16. 1818.  
Ref.: Moraes R. (1990), Killeen & Schulenberg (1998).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, PA, SC.  
Muestra: *M.H. Nee 51682* (MO, NY).

**[Piper duidaeense Trel.]**, Bull.

Torrey Bot. Club 38: 355. 1931.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Piper dumosum Rudge**, Pl. Guian.

1: 13, t. 14. 1805.  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, LP, PA, SC.  
Muestra: *T. Killeen 8211* (HUA, MO, USZ).

**Piper fonteboanum Yunck.**, Bol. Inst.

Bot. (São Paulo) 3: 23, f. 17. 1966.  
Subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, PA, SC.  
Muestra: *G.T. Prance et al. 5724* (NY).

**Piper formosum (Miq.) C. DC.**,

Prodr. 16(1): 286. 1869.  
Sin.: *Artanthe formosa* Miq.  
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *S.G. Beck 28160* (HUA, LPB).

**Piper fuligineum Kunth**, Linnaea

13: 655. 1839 [1840].  
Subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Campos Amazónicos, 0–1000 m.  
Dept.: SC.  
Muestra: *T. Killeen 1434* (MO, NY).

**Piper gaudichaudianum Kunth**,

Linnaea 13: 639. 1839 [1840].  
Ref.: Yuncker (1953b), Nee (2004).  
Subarbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–500, 1000–2500 m.  
Dept.: CH, CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *F.J. Fernández Casas & A. Susanna 8316* (MA, MO, NY).  
Nom. Vern.: Pariparoba.

**Piper heterophyllum Ruiz & Pav.**,

Fl. Peruv. 1: 34, t. 56, f. a. 1798.  
Sin.: *Piper punctatum* Ruiz & Pav., *Piper buchtienii* C. DC., *Piper charopampanum* C. DC., *Piper obovatum* var. *bolivianum* C. DC., *Piper elliptico-oblongifolium* Trel., *Piper rurrenbaqueanum* Trel., *Piper buchtienii* var. *charopampanum* (C. DC.) Yunck.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Nee (2004).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *T.B. Croat et al. 84703* (HUA, LPB, MO).

**Piper hieronymi C. DC.**, Revis.

Gen. Pl. 3(2): 273. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a), Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas,

Bosque Tucumano-Boliviano, Valles Secos, 0–500, 1000–2500 m.  
Dept.: BE, CH, CO, LP, SC, TA.  
Muestra: *M. Cárdenas 2852* (F, ILL).  
Infra: *Piper hieronymi* var. *glabrum* C. DC.

**[Piper hispidum Sw.]**, Prodr. 15. 1788.

Ref.: Burger (1971), Nee (2004).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. sancti-felicitis* (Burger 1971).

**Piper hostmannianum (Miq.) C. DC.**,

Prodr. 16(1): 287. 1869.  
Sin.: *Artanthe hostmanniana* Miq.  
Liana, arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, PA, SC.  
Muestra: *G.T. Prance et al. 6222* (NY).

**Piper itayanum Trel.**, Publ. Field Mus.

Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 177. 1936.  
Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *L. Cayola et al. 548* (HUA, LPB, MO).

**Piper ivonense Yunck.**, Lilloa 32:

20, f. 4. 1967.  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE.  
Tipo: *E.R. de la Sota 1029* (HT: ILL).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**Piper laevigatum Kunth**, Nov. Gen.

Sp. (quarto ed.) 1: 56. 1815 [1816].  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Parker & Bailey (1991), Alverson et al. (2000).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, LP, PA, SC.  
Muestra: *T.B. Croat et al. 84848* (BR, F, HUA, LPB, MO, NY).

**Piper lanceolatum Ruiz & Pav.**, Fl.

Peruv. 1: 36, t. 61, f. b. 1798.  
Sin.: *Piper nigro-granulatum* Trel.  
Ref.: Foster (1958), Nee (2004).  
Subarbusto, arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–2500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Muestra: *B.A. Krukoff 10332* (A, MO, NY).

**Piper lehmannianum (Miq.) C. DC.**,

Prodr. 16(1): 368. 1869.  
Sin.: *Artanthe lehmanniana* Miq., *Piper laevilimum* C. DC.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: BE, LP, SC.

Muestra: *A. Araujo M. et al. 594* (LPB, MO).

**Piper longestylosum C. DC.**, Bull.

Torrey Bot. Club 21(4): 161. 1894.  
Sin.: *Piper bopianum* Trel.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Parker & Bailey (1991), Nee (2004).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–2000 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Tipo y muestra: *M. Bang 1233* (HT: G; IT: GH, MO, NY fragm., NY), *M.A. Jaramillo et al. 1134* (HUA, MO, NY, UMO, US, USZ, Z).

**Piper longichaetum Yunck.**, Lilloa 27: 127, t. 15. 1955.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: BE, LP, PA.

Tipo y muestra: *M. Cárdenas 1325* (HT: ILL), *J.C. Solomon 7966* (MO).

**Piper mapireense C. DC.**, Bull.

Torrey Bot. Club 19: 47. 1892.

Sin.: *Piper mapireense* var. *magnifolium* C. DC., *Piper rectispicum* Trel., *Piper rusbyi* var. *hirsutum* Yunck.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), González et al. (1999).

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–2000 m.  
Dept.: CO, LP, SC, TA.

Tipo y muestra: *H.H. Rusby 2180* (HT: NY; IT: GH, MO-2160374), *A. Araujo M. et al. 797* (BOLV, HSB, HUA, LPB, MO, USZ).

Nom. Vern.: Pariparoba.

**[Piper marequitense C. DC.]**,

Prodr. 16(1): 290. 1869.

Ref.: Foster (1958), Nee (2004).

Nota: El registro se basa en material mal identificado de *P. crassinervium* principalmente.

**Piper mercens Yunck.**, Lilloa 27: 135, t. 19, f. 1. 1955.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Subarbusto. Endémica. Andes. Yungas, 1500–2500 m.

Dept.: LP.

Tipo y muestra: *Y.E.J. Mexia 7814* (HT: GH; IT: BM, F, ILL, K, MO-1180552, NY, U, UC, US), *S.G. Beck 1212* (LPB, NY).

**Piper microtrichum C. DC.**, Repert.

Spec. Nov. Regni Veg. 13: 310. 1914.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Subarbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.

Dept.: LP.

Tipo: *O. Buchtien 1330* (HT: G; IT: B, GH, HBG, US; fotos: F ex B, MO).

Nota: Conocida solamente del tipo.

**Piper multiplinervium C. DC.**, J. Bot. 4: 214. 1866.

Liana. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, LP, PA, SC.

Muestra: *A.F. Fuentes C. et al. 3729* (BOLV, HSB, HUA, LPB, MA, MO, USZ).

**Piper nematanthera C. DC.**, Prodr. 16(1): 367. 1869.

Sin.: *Nematanthera guianensis* Miq., *Piper acreanum* C. DC.

Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).  
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: SC.

Muestra: *R. Guillén V. & R. Choré 3117* (AAU, HUA, MO, NY, USZ).

**Piper nigriconnectivum C. DC.**, Meded. Rijks-Herb. 27: 7. 1915.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Endémica. Andes. Yungas, 2000–2500 m.

Dept.: CO, LP.

Tipo y muestra: *T. Herzog 2309* (HT: G; IT: MO; fotos: F), *A.F. Fuentes C. et al. 10600* (LPB, MO).

**[Piper nigripicum C. DC.]**, 5: 330. 1909.

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Piper obliquum Ruiz & Pav.**, Fl.

Peruv. 1: 37–38, pl. 63, f. a. 1798.

Sin.: *Piper caracasana* Bredem. ex Link  
Ref.: Moraes R. (1990), Seidel (1993a), Killeen & Schulenberg (1998), Alverson et al. (2000), Arrázola Rivero et al. (2000), Montambault (2002), Nee (2004).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, SC.

Muestra: *T.B. Croat et al. 84562* (HUA, LPB, MA, MO).

Nota: Frecuentemente confundido con *P. percostatum*.

Nom. Vern.: Matico.

**[Piper obovatum Vahl]**, Eclog.

Amer. 1: 5. 1796.

Ref.: Parker & Bailey (1991).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Piper orthostachyum Kunth**,

Linnaea 13: 602. 1839 [1840].

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes.

Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–1500 m.

Dept.: CH, LP, SC.

Muestra: *A. Araujo M. et al. 2425* (BOLV, HUA, LPB, MA, MO, USZ).

**Piper oxyphyllum C. DC.**, Bull.

Torrey Bot. Club 19: 48. 1892.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Liana. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2500 m.

Dept.: LP.

Tipo y muestra: *H.H. Rusby 2176* (HT: NY; IT: NY), *A.F. Fuentes C. 11489* (BOLV, HUA, LPB, MO, USZ).

**Piper pachyphloium C. DC.**, Revis.

Gen. Pl. 3(2): 274. 1898.

Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1000, 1500–2000 m.

Dept.: BE, CO.

Tipo y muestra: *O. Kuntze s.n.* (HT: NY; IT: MO, US; fotos: F ex B), *S.G. Beck 16608* (LPB).

Infra: *Piper pachyphloium* var. *macrophyllum* Yunck.

**Piper pandoense Yunck.**, Lilloa 32: 18. 1966.

Subarbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, 0–500 m.

Dept.: PA, SC.

Tipo y muestra: *E.R. de la Sota 932* (HT: ILL; IT: NY), *B. Mostacedo & R.B. Foster 86* (LPB, USZ).

**Piper pellitum C. DC.**, Verh. Bot.

Vereins Prov. Brandenburg 47: 114. 1905.

Ref.: Nee (2004).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Muestra: *J.C. Solomon & S. Urcullo 14083* (AAU, F, HUA, LPB, MO, NY).

**Piper peltatum L.**, Sp. Pl. 1: 30. 1753.

Sin.: *Pothomorphe peltata* (L.) Miq.

Ref.: Yuncker (1953b), Parker & Bailey (1991), Killeen & Schulenberg (1998), Nee (2004).

Hierba, subarbusto, arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500, 2000–2500 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Muestra: *M.A. Jaramillo et al. 1217* (HUA, MO, UMO, USZ).

Nom. Vern.: Santa maría.

**Piper peltilimum Yunck.**, Lilloa 27: 155, t. 37. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbolito, árbol. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *Y.E.J. Mexia 7823* (HT: US; IT: F, GH, ILL, MO, U), *C.B. Maldonado et al. 2318* (BOLV, HSB, HUA, LPB, MO, USZ).

**Piper percostatum Yunck.**, Lilloa 27: 157–158, t. 39. 1953.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a).  
Arbusto, arbolito. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby 2174* (HT: US; IT: F, GH, MO, NY), *O. Buchtien 574* (F, GH, NY, US).  
Nota: Occasionalmente confundido con *P. obliquum*.

**Piper perscabrifolium Yunck.**, Lilloa 27: 111, t. 7, f. 1. 1953.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a).  
Arbusto, arbolito. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Tipo y muestra: *M. Cárdenas 3252* (HT: F), *M.A. Jaramillo & R. Hurtado 1249* (AAU, HUA, MO, NY, UMO, USZ).

**Piper pilirameum C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 229–230. 1911.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a), Killeen & Schulenberg (1998).  
Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–2500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 1317* (ST: GH, MO, US; fotos: F), *M.A. Jaramillo et al. 1238* (HUA, K, MO, NY, USZ, Z).  
Infra: *Piper pilirameum* var. *subglabrum* Yunck.

**Piper piscatorum Trel. & Yunck.**, Piperac. N. South Amer. 1: 395, f. 356. 1950.  
Subarbusto, arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, PA.  
Muestra: *C. Gutiérrez & J.C. Rodríguez 703* (USZ).

**Piper praeacutilimum C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 231. 1911.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 1337* (HT: US), *D.C. Daly 2104* (LPB, MO).

**Piper pseudoarboreum Yunck.**, Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3: 113–114, f. 99. 1966.  
Ref.: Seidel (1993a).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Muestra: *C.R. Sperling & S.R. King 6432* (LPB, NY).

**Piper pseudogrande Yunck.**, Lilloa 27: 146, t. 27, f. 1. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–500, 1500–2000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *M. Bang 2640* (HT: NY; IT: US), *A.F. Fuentes C. et al. 7467* (BOLV, CTES, HSB, LPB, MA, MO, RB, US, USZ).

**Piper pseudoperuvianum C. DC.**, Prodr. 16(1): 282–283. 1869.  
Sin.: *Artanthe peruviana* fo. *laevigata* Miq.  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 500–1000 m.  
Muestra: *H.H. Rusby 2181* (NY).

**Piper psilophyllum C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 19(2): 47. 1892.  
Sin.: *Piper unduavinum* C. DC., *Piper psilophyllum* var. *lanceifolium* Yunck.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a).  
Arbusto, arbolito. Endémica. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby 2186* (HT: GH; IT: NY), *A.F. Fuentes C. et al. 6816* (BOLV, CTES, HSB, HUA, LPB, MO, USZ).  
Infra: *Piper psilophyllum* fo. *longepedunculatum* Yunck.

**Piper puberulinerve C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 231. 1911.  
Sin.: *Piper subarborescens* C. DC.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto, arbolito. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500, 2000–3000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 1334* (HT:

US; IT: B, F, GH, MO; fotos: F), *A.F. Fuentes C. & G. Navarro 2204* (USZ).  
Infra: *Piper puberulinerve* var. *subarborescens* (C. DC.) Yunck.

**Piper pubiovarium Yunck.**, Lilloa 27: t. 25, f. 2. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Arbusto. Endémica. Andes. Yungas, 1500–3000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *M. Cárdenas 698* (HT: US), *A.F. Fuentes C. et al. 6853* (LPB, MO).  
Nota: Tal vez un sinónimo de *P. coruscans*.

**Piper punctulantherum C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 233. 1911.  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 1327* (HT: US), *L. Cayola et al. 2483* (HUA, LPB, MO).

**Piper reticulatum L.**, Sp. Pl. 1: 29. 1753.  
Ref.: Alverson et al. (2000).  
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: LP, PA.  
Muestra: *D. De la Quintana et al. 230* (HUA, LPB, MA, MO).

**Piper rogaguanum Trel.**, Mem. New York Bot. Gard. 7: 225. 1927.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas. Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.  
Dept.: BE.  
Tipo: *H.H. Rusby 1689* (HT: NY; IT: ILL).  
Nota: Conocida solamente del tipo. Tal vez un sinónimo de otra especie.

**Piper rusbyi C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 19: 47. 1892.  
Sin.: *Piper umbrigaudens* C. DC.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby 2188* (HT: NY), *A. Araujo M. et al. 2299* (BOLV, HUA, MA, MO, USZ).

**Piper sancti-felicis Trel.**, Contr. U.S. Natl. Herb. 26(2): 35. 1927.  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Tipo: *M. Cárdenas 2087* (HT: ILL; IT:

- HUA frag., NY, US).  
Nota: Conocida en Bolivia solamente del tipo.
- Piper scabrifolium Hook. & Arn.**, Bot. Beechey Voy. 310. 1841 [1838]. Arbusto. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *J.C. Solomon & M. Moraes R. 17254* (CTES, HUA, K, LPB, MA, MICH, MO, NY, SEMO, Z).
- Piper secundum Ruiz & Pav.**, Fl. Peruv. 1: 36, t. 62. 1798.  
Sin.: *Piper glabratum* Kunth  
Ref.: Nee (2004).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 0–2500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC, TA.  
Muestra: *A. Araujo M. & F. Canqui 3879* (BOLV, CTES, HSB, HUA, LPB, MA, MO, NY, RB, US, USZ).
- Piper semimetrale C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 232–233. 1911.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Seidel (1993a), Nee (2004).  
Arbusto, arbolito. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–1500 m.  
Dept.: LP, SC.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 1321* (HT: US), *M. Cornejo et al. 241* (BOLV, CTES, HUA, LPB, MA, MO, USZ).
- Piper sotai Yunck.**, Lilloa 32: 17. 1966.  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE.  
Tipo: *E.R. de la Sota 814* (HT: ILL; IT: NY).  
Nota: Conocida solamente del tipo.
- Piper steinbachii Yunck.**, Lilloa 27: 136, t. 136. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Subarbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: BE, SC.  
Tipo y muestra: *J. Steinbach 2362* (HT: BA; IT: SI), *T. Killeen & K. Smith 3644* (MO).
- Piper subsilvestre C. DC.**, Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 6: 452. 1917.  
Liana, subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: PA.  
Muestra: *C.R. Sperling & S.R. King 6516* (F, LPB, MO).
- Piper subsilvulanum C. DC.**, Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 6: 453. 1917.  
Sin.: *Piper dilatatum* var. *pubescens* C. DC., *Piper svidifolium* Trel.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, SC.  
Tipo y muestra: *T. Herzog 1475* (HT: B; IT: GH, MO; fotos: F ex B), *M.H. Nee 44410* (MO, NY).
- Piper trichogynum C. DC.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 233. 1911.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Nee (2004).  
Liana. Endémica. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–2000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 1332* (ST: US), *M.A. Jaramillo et al. 1221* (HUA, MO, UMO, USZ).
- Piper trichorhachis C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 25: 566. 1898.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Yungas, 500–3000 m.  
Dept.: LP, TA.  
Tipo y muestra: *H.A. Weddell 4264* (HT: P), *J.C. Solomon 9509* (LPB, MO).
- Piper trigoniastriifolium C. DC.**, Bull. Torrey Bot. Club 25: 567. 1898.  
Ref.: Foster (1958).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–500, 2000–2500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *M. Bang 2197* (HT: G; IT: GH, NY, US), *S.G. Beck 3097* (LPB, NY).
- Piper trigonum C. DC.**, J. Bot. 4: 212. 1866.  
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).  
Subarbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *A. Araujo M. et al. 1645* (LPB, MO, NY, SRP).
- Piper tuberculatum Jacq.**, Icon. Pl. Rar. 2(16): 2, t. 211. 1795.  
Sin.: *Piper tuberculatum* var. *minus* C. DC., *Piper arboreum* subsp. *tuberculatum* (Jacq.) Tebbs  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958), Moraes R. (1990), Seidel (1993a), Nee (2004).  
Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo
- Chiquitano, Sabanas Benianas del Sur, Campos Amazónicos, 0–1000 m.  
Dept.: BE, LP, PA, SC.  
Muestra: *H.H. Rusby 2177* (F, GH, NY, US).  
Nom. Vern.: Ambayvillo.
- Piper tucumanum C. DC.**, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 253. 1898.  
Ref.: Schulenberg & Awbrey (1997), González et al. (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004), Zenteno Ruiz & López (2010).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Seco Chaqueño, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Valles Secos, 500–2000 m.  
Dept.: CH, LP, TA.  
Muestra: *R. Seidel 8644* (HUA, LPB, MA, MO).
- Piper tumupasense Yunck.**, Lilloa 27: 106. 1953.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Arbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.  
Dept.: BE, LP.  
Tipo y muestra: *R.S. Williams 496* (HT: NY; IT: US), *S.G. Beck 8038* (LPB, M, NY).
- Piper umbellatum L.**, Sp. Pl. 1: 30. 1753.  
Sin.: *Lepianthes umbellata* (L.) Raf., *Pothomorphe umbellata* (L.) Miq., *Piper umbellatum* var. *vestitum* C. DC., *Pothomorphe umbellata* var. *vestita* (C. DC.) Yunck.  
Ref.: Yuncker (1953b), Foster (1958).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP.  
Muestra: *A.F. Fuentes C. et al. 1858* (HUA, MO, USZ).
- Piper villosissimum Yunck.**, Lilloa 27: 148, t. 29. 1955.  
Ref.: Yuncker (1953b).  
Arbusto. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *R. Scolnik & Luti 481* (HT: US), *J.C. Solomon 12976* (LPB, MO).
- Piper vitaceum Yunck.**, Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3: 76–77, f. 66. 1966.  
Liana. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.  
Dept.: PA.  
Muestra: *C.R. Sperling & S.R. King 6578* (F, LPB, MO, NY).

**Piper yungasanum Yunck.**, Lilloa 32: 21, f. 5. 1967.  
Arbusto. Endémica. Andes. Yungas, 1000–1500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo: *E.R. de la Sota 569* (HT: ILL).  
Nota: Conocida solamente del tipo.

**PITTOSPORACEAE R. Br.**, Voy. Terra Austral. 2: 542. 1814.

Por P.M. Jørgensen (MO); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB).  
1 género, 2 especies, 0 especies endémicas.

**Pittosporum Banks ex Gaertn.**, Fruct. Sem. Pl. 1: 286, pl. 59, f. 7. 1788.

2 especies, 0 especies endémicas.

**Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn.**, Fruct. Sem. Pl. 1: 286, pl. 59. 1788.

Ref.: Solomon (1991).

Arbolito. Cultivada. Andes. Valles Secos, 3500–4000 m.

Dept.: LP.

Muestra: *J.C. Solomon 15682* (BOLV, LPB, MO, NY).

**Pittosporum undulatum Vent.**, Descr. Pl. Nouv. pl. 76. 1802.

Ref.: Solomon (1991), Jørgensen & Ulloa Ulloa (1994), Jørgensen (1999e).  
Arbolito. Cultivada. Andes. Valles Secos, 2500–4000 m.

Dept.: CO, LP.

Muestra: *J.C. Solomon & R. Zeballos 15548* (HSB, LPB, MO, NY).

**PLANTAGINACEAE Juss.**, Gen. Pl. 89–90. 1789.

Por B. León (USM) [*Callitriche*], S.G. Beck (LPB) [*Angelonia*, *Antirrhinum*, *Basistemon*, *Boelckea*, *Conobea*, *Cymbalaria*, *Digitalis*, *Hebe*, *Limnophila*, *Linaria*, *Maurandya*, *Mecardonia*, *Micranthemum*, *Misopates*, *Ourisia*, *Penstemon*, *Russelia*, *Scoparia*, *Sibthorpia*, *Veronica*], M.d.I.M. Sosa (CTES) [*Bacopa*, *Conobea*, *Gratiola*, *Linaria*, *Mecardonia*, *Micranthemum*, *Scoparia*, *Stemodia*, *Veronica*], R.I. Meneses (LPB) [*Bougeria*, *Plantago*] y P.M. Jørgensen (MO) [*Plantago*]; revisado por J.C. Penagos (MO), M. Nee (NY).

25 géneros, 84 especies, 7 especies endémicas.

**Angelonia Bonpl.**, Pl. Aequinoct. 2(14): 92–94, pl. 108. 1809 [1812].  
3 especies, 2 especies endémicas.

**Angelonia acuminatissima Herzog.**

Meded. Rijks-Herb. 29: 33. 1916.

Ref.: Foster (1958), Fischer (2004).

Hierba. Endémica. Zonas Bajas.

Bosque Seco Chaqueño, 0–500 m.

Dept.: SC.

Tipo y muestra: *T. Herzog 1287* (HT: L), *M.H. Nee 38939* (LPB, MO, NY).

Nota: Falta revisión, posiblemente endémica a Bolivia, similar a *A. salicariifolia* Bonpl.

**Angelonia chiquitensis Herzog.**

Meded. Rijks-Herb. 29: 33. 1916.

Ref.: Foster (1958), Fischer (2004).

Hierba, subarbusto. Endémica. Zonas Bajas. Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Seco Chaqueño, 0–500 m.

Dept.: SC.

Tipo y muestra: *T. Herzog 129* (HT: L), *D.C. Daly et al. 2248* (LPB, MO, NY).

Nota: Falta revisión, hojas similares a *A. integerrima*, pero completamente glabra.

**Angelonia gardneri Hook.**, Bot.

Mag. 66: pl. 3754. 1840.

Ref.: Zuloaga et al. (2008f).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.

Dept.: SC.

Muestra: *S.G. Beck 27908* (CTES, LPB).

**Angelonia integerrima Spreng.**,

Syst. Veg. 4(2): 235. 1827.

Ref.: Zuloaga et al. (2008f).

Nota: Esperada.

**Antirrhinum L.**, Sp. Pl. 2: 612.

1753.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Antirrhinum majus L.**, Sp. Pl. 2:

617. 1753.

Ref.: Brako (1993j), Jørgensen (1999f), Zuloaga et al. (2008f).

Hierba. Cultivada. Andes. Valles Secos, 3000–3500 m.

Dept.: LP.

Muestra: *J.C. Solomon 12739* (LPB, MO).

**Bacopa Aubl.**, Hist. Pl. Guiane 1:

128–130, pl. 49. 1775.

17 especies, 0 especies endémicas.

**Bacopa aquatica Aubl.**, Hist. Pl.

Guiane 1: 129–130, t. 49. 1775.

Ref.: Holmgren & Vincent (2005),

Wood et al. (2011).

Hierba, acuática. Nativa. Zonas

Bajas. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, 0–500 m.  
Dept.: SC.

Muestra: *N.P. Ritter & M. Garvizu 4691* (LPB, MO, NHA).

**Bacopa axillaris (Benth.) Standl.**,

J. Wash. Acad. Sci. 15(20): 460.

1925.

Sin.: *Herpestis axillaris* Benth.,

*Monniera axillaris* (Benth.) Kuntze,

*Caconapea axillaris* (Benth.) Pennell

Ref.: Standley & Williams (1973), Holmgren & Molau (1984), Jørgensen (1999f), Burger & Barringer (2000), Wood et al. (2011).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.

Dept.: BE, SC.

Muestra: *M.R. Orellana 881* (LPB).

**Bacopa dubia Chodat & Hassl.**, Bull.

Herb. Boissier, sér. 2, 4: 290. 1904.

Ref.: Descole & Borsini (1954).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, 0–500 m.

Dept.: SC.

Muestra: *B. Bruderreck 379* (LPB).

**Bacopa gratioloides (Cham.)**

**Chodat & Hassl.**, Bull. Herb.

Boissier, sér. 2, 4: 288. 1904.

Sin.: *Caconapea gratioloides* Cham.

Ref.: Holmgren & Vincent (2005).

Hierba, acuática. Nativa. Zonas Bajas. Campos Amazónicos, 0–500 m.

Dept.: LP.

Muestra: *S.G. Beck 18431* (BAF, CTES, GB, LPB).

**Bacopa lanigera (Cham. & Schtdl.)**

**Wettst.**, Nat. Pflanzenfam. 4(3b):

77. 1891.

Sin.: *Herpestis lanigera* Cham. & Schtdl.

Ref.: Zuloaga et al. (2008f).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, 0–500 m.

Dept.: SC.

Muestra: *J.R.I. Wood 24171* (K, LPB, USZ).

**Bacopa laxiflora (Benth.) Wettst.**

**ex Edwall**, Bol. Commiss. Geogr.

Estado Sao Paulo 13: 176, 180. 1897.

Sin.: *Herpestis laxiflora* Benth., *Herpestis*

*auriculata* B.L. Rob., *Bacopa auriculata*

(B.L. Rob.) Greenm., *Caconapea*

*auriculata* (B.L. Rob.) Pennell, *Mella*

*laxiflora* (Benth.) Pennell

Ref.: Burger & Barringer (2000),

Holmgren & Vincent (2005), Wood et al. (2011).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Sabanas Benianas del Sur, 0–500 m.