

- joaziero*. Esta especie es endémica de Piura (Perú).
- RHIZOPHORACEAE Pers., Syn.**
Pl. 2(1): 2. 1806.
- Por M. Toledo (Instituto Boliviano de Investigación Forestal) y G.T. Prance (RNG); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).
2 géneros, 2 especies, 0 especies endémicas.
- Cassipourea Aubl., Hist. Pl. Guiane** 1: 528. 1775.
1 especie, 0 especies endémicas.
- Cassipourea peruviana Alston,** Kew Bull. 1925: 268. 1925.
Sin.: *Cassipourea ulei* Briq.
Ref.: Prance et al. (1975), Justiniano & Toledo (2001).
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.
Dept.: PA.
Muestra: *M. Toledo et al. 1229* (LPB, MO, U, USZ).
- Sterigmapetalum Kuhlm., Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro** 4: 359. 1925.
1 especie, 0 especies endémicas.
- Sterigmapetalum obovatum Kuhlm., Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro** 4: 360, pl. 32. 1925.
Ref.: Prance et al. (1975), Justiniano & Toledo (2001).
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.
Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.
Muestra: *B. Mostacedo 2993* (MO, USZ).
- ROSACEAE Juss., Gen. Pl.** 334. 1789.
- Por K. Romoleroux (QCA), R.I. Meneses (LPB) y S. Achá (LPB) [*Prunus*]; revisado por S.G. Beck (LPB), M. Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).
27 géneros, 127 especies, 21 especies endémicas.
- Acaena Mutis ex L., Mant. Pl.** 2: 145, 200. 1771.
5 especies, 2 especies endémicas.
- Acaena boliviana Gand., Bull. Soc. Bot. France** 59: 707. 1913.
Ref.: Foster (1958).
Hierba. Endémica. Región, tipo de vegetación y elevación desconocidas.
- Dept.: Bolivia.
Tipo: *M. Bang 1821* (HT: LY).
Nota: Conocida solamente del tipo.
- Acaena cylindristachya Ruiz & Pav., Fl. Peruv.** 1: 68, t. 104, f. a. 1798.
Sin.: *Acaena macrorrhiza* Hook. f.
Ref.: Bitter (1911), Foster (1958), Serrano & Terán (1998 [2000]).
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 2500–4000 m.
Dept.: CH, CO, LP.
Muestra: *J.C. Solomon et al. 11822* (LPB, MO).
Infra: *Acaena cylindristachya* subvar. *pusilla* Bitter, *Acaena cylindristachya* var. *nitidissima* Bitter
- [Acaena elongata L.], Mant. Pl.** 2: 200. 1771.
Ref.: Foster (1958).
Nota: El registro se basa en material mal identificado.
- Acaena longiscapa Bitter, Biblioth. Bot.** 17(Heft 74): 195. 1910.
Ref.: Foster (1958).
Hierba. Endémica. Región, tipo de vegetación y elevación desconocidas.
Dept.: Bolivia.
Tipo: *Anonymus s.n.* (HT: B destr.).
Nota: Conocida solamente del tipo.
- Acaena ovalifolia Ruiz & Pav., Fl. Peruv.** 1: 67, pl. 103. 1798.
Sin.: *Ancistrum repens* Vent., *Acaena ovalis* Pers., *Acaena ovalifolia* var. *subserrata* Bitter
Ref.: Foster (1958), Romoleroux (1996), González et al. (1999).
Hierba. Nativa. Andes, Altiplano. Yungas, Puna Húmeda, 2000–2500, 3000–4500 m.
Dept.: BE, CH, CO, LP, TA.
Muestra: *J.C. Solomon & J. Kuijt 11522* (LPB, MO).
Infra: *Acaena ovalifolia* var. *calvescenticupula* Bitter, *Acaena ovalifolia* var. *subsexjuga* Bitter
- Acaena stricta Griseb., Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen** 19: 138. 1874.
Sin.: *Acaena pinnata* Citerne
Ref.: Bitter (1911), Foster (1958).
Hierba. Nativa. Andes. Valles Secos, 2500–3000 m.
Dept.: CH, CO, LP, TA.
Muestra: *S.G. Beck & N.Y. Paniagua 27445* (LPB).
Infra: *Acaena stricta* var. *robusta* Bitter, *Acaena stricta* var. *gracilis* Bitter
- Alchemilla L., Sp. Pl.** 1: 123. 1753.
0 especies, 0 especies endémicas.
- [Alchemilla neglecta Rothm.],** Revista Sudamer. Bot. 2: 12. 1935.
Hierba. Nativa. Andes. Páramo Yungueño, 2500–3000 m.
Dept.: LP.
Muestra: *G. Mandon 664 pp* (P).
Nota: Especie dudosa.
- Aphanes L., Sp. Pl.** 1: 123. 1753.
3 especies, 0 especies endémicas.
- Aphanes andicola Rothm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.** 13(2/3): 1109. 1938.
Ref.: Rothmaler (1938), Gutte (1985), Romoleroux & Frost-Olsen (1996).
Hierba. Nativa. Andes. Valles Secos, 3500–4000 m.
Dept.: LP.
Muestra: *S.G. Beck 463* (LPB).
Nota: El material citado no coincide completamente con ninguna especie de *Aphanes* descrita para Sudamérica, se trata probablemente de una especie nueva.
- Aphanes looseri (Rothm.) Rothm.,** Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42: 173. 1937.
Sin.: *Alchemilla looseri* Rothm.
Hierba. Nativa. Andes. Valles Secos, 2500–3000 m.
Dept.: LP.
Muestra: *G. Mandon 664 pp* (P).
Nota: Conocido solamente por esta muestra.
- Aphanes parvula Gutte, Wiss. Z. Karl-Marx-Univ. Leipzig, Math.-Naturwiss. Reihe** 34(4): 455. 1985.
Ref.: Gutte (1985), Romoleroux (1996), Romoleroux & Frost-Olsen (1996).
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 3500–4000 m.
Dept.: CH, CO, LP.
Muestra: *I. Hensen 804* (LPB).
- Chaenomeles Lindl., Trans. Linn. Soc. London** 13(1): 97. 1821.
1 especie, 0 especies endémicas.
- Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz., Bot. Mag. (Tokyo)** 23(272): 173. 1909.
Sin.: *Cydonia lagenaria* Loisel.
Arbusto. Cultivada. Andes, Altiplano. Valles Secos, Puna Húmeda, 3000–4000 m.
Dept.: LP.
Muestra: *J.C. Solomon & R. Zeballos 15550* (LPB, MO, USZ).
Nom. Vern.: Membrillo japonés.